

舒畅。黑芥穗可以通络行血归经。总观全方，重在调达肝脾，使肝有所藏，脾能统摄，则郁开血止而诸症告愈。

八、产后留瘀 逐瘀止血

逐瘀止血法，适用于产后及人工流产后恶露不尽，可见色黑夹块，量时多时少；或妊娠时腹部因外伤所致瘀血等症。

例八：余××，29岁。1978年12月初诊。产后月余，少腹胀满，刺痛拒按，恶露不尽，色紫有块。患者面色晦滞，舌质紫黯，脉沉涩。证属血瘀内停。治宜活血化瘀，拟生化汤合失笑散加减。

处方：当归、元胡、香附、益母草各10克，生蒲黄(包)、五灵脂、川芎各6克，桃仁、炮姜各3克。药服五剂后，出血量减少，腹痛好转，续服三剂痊愈。

按：产后血瘀，宜活血祛瘀，行血止痛，选蒲黄、五灵脂逐瘀，当归、桃仁活血化瘀，香附理气，川芎、元胡行血中之气，炮姜祛瘀散寒而止痛。若胎盘残留宫内，宜加川牛膝、天花粉促进残留组织排出宫腔。

九、寒凝血滞 温经通络

温经止血法，此法适用于产后恶露淋漓，过月不尽，形寒怯冷，少腹冷痛。

例九：陶××，28岁。1979年5月初诊。产后一周，用冷水洗衣，随之腹胀隐痛，畏寒，恶露淋漓不止，血色暗红，苔薄白，舌质淡，脉弦细涩。证属寒凝血瘀。宜温经散寒，

活血祛瘀，拟温经汤加减。

处方：当归、阿胶各10克，吴茱萸、半夏各6克，生姜、炮姜、川芎各3克，桃仁、炙甘草各2克。

按：《诸病源候论》指出：“新产而取风凉，皆令风冷搏于血，致使血不宜消，蓄积在内，则有时血露淋漓不尽。”证属虚中夹实。选用吴茱萸、生姜、半夏、阿胶等温经通络，养血祛瘀。刚柔并济，虚实兼顾。

十、热迫下血 清热凉血

清营止血法，此法适用于产后恶露淋漓不净，或恶露净后再次出血不止，症见恶露时下如注，色鲜红且稠，气臭，时有腹痛。

例十：胡××，24岁。1978年9月初诊。因人工流产后淋漓月余，血量中等，色鲜质粘。患者面赤口干，舌红苔薄，脉数。证属下焦蕴热，迫血下行。宜清热止血，拟清海汤加减。

处方：生地20克，丹皮、山梔、当归、山药、玄参、麦冬各10克，白芍、侧柏叶、地榆炭各10克，炙甘草3克。服三剂后，出血减少，但仍有腹痛，加川芎、丹参祛瘀生新。再进五剂后，血止而愈。

按：方选丹皮、山梔、生地清热凉血以清血海，白芍、侧柏叶、地榆清营热而止血，玄参、麦冬、当归凉血和血，山药、炙甘草益脾扶正，川芎、丹参祛瘀生新。诸药合用，共收清营祛瘀止血之效。

石滑散治疗急性湿疹

山东省巨野县夏官屯公社卫生院 王可进

笔者应用已故曾祖父治疗急性湿疹的经验方石滑散治疗急性湿疹，临床疗效确切，现介绍如下。

一、药物及制法：石滑散由煅石膏、滑石各30克，青黛、黄柏末各15克，枯矾10克，冰片、轻粉各5克组成。以上药物共研极细末，装瓶备用。

二、适应症：急性湿疹湿热偏盛期。症见皮肤剧烈瘙痒，潮红灼热，轻度肿胀，局部皮损，丘疹疱疹、糜烂渗水，浸淫成片，或结痂等。

三、使用方法：将药粉干撒于患处。如经治疗后渗液减少或已无渗液，可用麻油适量将药粉调成糊状，敷于患处。一般每天换药2次，换药时宜用湿棉棒轻轻拭去原上旧药。用药期间忌用水洗患处，以免皮损出现渗液，疮面扩散。并禁食烟酒辛辣肥腻等刺激性食物。

四、治疗结果：一般用药3天，换药6次，渗液可基本消失，约1周皮损可痊愈。