

半夏、炒黄芩、丹皮各 10 克，夏枯草、花粉、黄药子各 12 克，白薇 15 克，玫瑰花 5 克，牡蛎 30 克。6 剂。日二剂。

药后身热平降，每日体温波动在 37℃ 上下。再服 3 天，低热得平，体温恒定，结喉处疼痛消失，肿块缩小，无压痛。血沉 48 毫米/小时，遂改从健脾调肝法善后。13 天后病愈出院。

按：“亚急性非化脓性甲状腺炎”的病因尚未完全阐明，一般认为和病毒感染有关。西医

主要以激素治疗，症状缓解较快，但全疗程需 1~2 月。本例以清火解郁，化痰散结为法，治疗 9 天，身热平降，调理 13 天病愈出院，疗效堪称满意。《谦斋医学讲稿》云：“郁证发热，在原因以七情为主，在内脏以肝胆两经为多。证状是午后低热，或忽寒忽热……《内经》上说：‘木郁达之’，治宜疏畅肝气而散郁热”，此论颇合本证病机，疏肝散郁不但可以退低热，亦能除大热。

中 药 外 治 痔 瘻 疾 患

上海中医学院附属岳阳医院痔瘻科 袁 有 富

一、药线置入疗法

因高位复杂性肛瘻，管道弯曲，西医手术时切除组织过多，易导致肛门功能损伤。所以我们一般采用药线挂线或药线插入疗法进行治疗，可减少损伤及手术后遗症。使用药线疗法时，应根据中医辨证施治，一般早期多用黄升丹药线，有较强的腐蚀作用。大约一周后管壁脱落，以后再用生肌散药线，直至肛瘻伤口愈合。对结核性肛瘻，可选用桃花丹药线（对结核菌有较强的抑制作用），一般在用药后 2 周就能促使肛瘻伤口愈合。我们用此法治疗 20 例患者（其中结核性肛瘻 2 例）。治愈率达 90% 以上。

典型病例：王××，男，35 岁，1983 年 7 月 15 日初诊。患肛瘻 5 年余，肛门旁经常胀痛，流脓流水，淋漓不净，形体消瘦，面色少华。肛门检查：左侧有 2 个肛瘻外口，距肛门约 5 厘米左右，内口位于肛管直肠环以上。诊断：高位肛瘻。采用黄升丹药线插入法和棉块加压疗法，40 天痊愈。

二、中药熏洗法

本法适用于痔核外脱嵌顿、肛缘水肿、血栓性外痔及脱肛等症。熏洗方药：明矾 15 克，赤石脂 15 克，五倍子 15 克，生百部 15 克，石榴皮 15 克，土槿皮 15 克，生甘草 6 克，土大黄 15 克。煎汤熏洗患处。本方具有较强的清热解毒、行瘀活血、温经通络、收敛固涩作用。又，热汤药可开腠理，使药物直达病处，从而加强了治疗效果。临床可随症加减。

典型病例：章××，女，35 岁，1983 年 8 月 3 日初诊。因习惯性便秘，过分劳责，以致肛旁有物外脱，

嵌顿疼痛，坐卧不安。肛门检查：见肛门旁有一个血栓性外痔，伴少量血性分泌物外溢。诊断：血栓性外痔。采用熏洗方外用。3 天后水肿消散，血栓吸收，肛旁的脱出物复位而痊愈。

三、敷贴疗法

敷贴疗法在痔瘻科应用范围较广，可根据药物的不同性质，选用清热消炎、活血散瘀、消肿止痛、生肌长肉、收敛伤口等敷贴方剂。常用者有：八宝丹、生肌散、九一丹、八二丹、红升丹、桃花丹、白降丹、玉红膏、金黄膏、玉露膏、黄连膏等。临床应根据伤口的不同情况辨证施治，大致可分为三期：初期：肛瘻切开术后，伤口内一般可塞入八宝丹或九一丹棉球，提脓拔毒祛腐，脓稀少后，仍选用八宝丹棉球置入，以促使创面早生新鲜肉芽。中期：施肛瘻切开术一周后，伤口肉芽新鲜，且有微小颗粒状突起（表明伤口肉芽组织生长良好），应置入生肌散、玉红膏之类（撒入伤口药物不易过多），以助其生肌长肉；如新鲜肉芽高低不平，可置入适量平胬丹配合生肌散，以提高生肌之疗效。后期：即肉芽组织基本长平，伤口干燥，多予生肌八宝丹置入，玉红膏纱布外盖，以促使表皮生长。我们以此法治疗 30 例肛瘻患者，好转率达 100%。

典型病例：施××，男，50 岁，1980 年 7 月初诊。患肛瘻十余年，肛旁时常有脓性分泌物外溢，污染衣裤。施肛瘻切开术，术后予九一丹棉球填入，4 天后脓水逐渐稀少，改用生肌八宝丹置入。半月后伤口痊愈。