

66% 提高到 98.4%。从性别和年龄看, 女性比男性见效快, 青壮年比 40 岁以上者见效快; 从病种分, 对传染性软疣效果最好, 其次为寻常疣、扁平疣, 特别对尖锐湿疣的效果较冷冻疗法、腐蚀疗法为优, 不会遗留瘢痕及其他后遗症。在治疗过程中可见, 寻常疣一般自行脱落; 扁平疣先是局部发红, 继之皮疹缩小、干枯、脱屑, 而最后恢复正常皮色。在疗程中患者自觉局部瘙痒。尖锐湿疣先为皮损缩小、干涸最后自行脱落, 恢复正常的皮肤粘膜外观。

我们对 22 例扁平疣作了治疗前后的淋巴

细胞转化实验, 未见淋转率值有降低或升高现象。从抗病毒及临床疗效看, 土贝母皂甙属于杀病毒或抑病毒制剂, 并非通过提高淋转率增强细胞免疫功能以达到对病毒的杀伤。但土贝母皂甙注射剂是作为一种植物干扰素对病毒杀伤呢? 还是通过其他机理影响病毒 DNA 的合成呢? 对其作用机转有待我们对总皂甙作深入研究, 确定其分子结构式。

我们认为土贝母皂甙制剂疗效满意, 是副作用少、剂量小、见效快的一种抗疣类药物, 值得进一步推广。

蟾蜍煎汁治疗术后转移性睾丸胚胎癌 1 例

外科 严泽承
中国人民解放军第 408 医院
中医科 王群红

宋××, 男, 33 岁, 农民, 1975 年 8 月入院。右睾丸肿物 3 个月。查体见右侧睾丸肿大如胎儿头, 右阴囊皮肤坏死、感染、液化。行右睾丸切除术, 术后切口愈合良好。病理科诊断: 睾丸胚胎癌。术后 2 个月行腹膜后淋巴结清扫术。病理学检查发现右精索淋巴结转移。第 2 次手术后 2 个月, 因咳嗽、胸闷、右腹股沟肿物复诊, 胸部放射线拍片发现右肺门处有一 3×3 厘米阴影。放射科诊断: 纵膈、肺部转移性病灶。右下腹相当于内环处可见一核桃大小肿物, 质硬, 触痛(++)。遂建议患者试用蟾蜍。病人每天取 1 只中等大小的蟾蜍, 除去五脏后洗净, 清水煮烂, 取煎汁饮用, 一天分 2 次于饭后半小时口服, 并用其汁涂抹右下腹肿物处, 一日 2 次。服药 10 天后即觉呼吸通畅, 食欲增加, 继续用药 2 个月后右拇指缝下流脓, 至第 3 个月流脓自行停止。自觉胸背疼痛消失, 无咳嗽, 呼吸通畅。胸透: 右肺门阴影显著缩小。蟾蜍煎汁外敷右腹股沟部肿物处, 开始局部渐肿大, 随后流脓水, 肿物变软变小直至消失。(在涂抹中局部有剧痛现象) 口服和外用蟾蜍煎汁持续半年, 迄今未重复使用, 术后 8 年复查, 胸部 X 线拍片正常, 病人感觉良好。

睾丸胚胎癌主要由胚胎性分化不良的细胞所组成。肿瘤常伴有出血及坏死, 发展较快, 预后不良。据 Vugrin 等报道: 第 II 期胚胎癌行睾丸切除及腹膜后淋巴结清扫术后约 40~50% 患者在一年内复发, 常

见转移部位为肺部。本患者病变已侵及阴囊、精索, 属 II 期, 而行腹膜后淋巴结清扫术后 2 个月胸部拍片已见肺门受累(III 期)。对此类患者, 多采用腹膜后淋巴结清扫术后坚持放射治疗和抗癌药物治疗。本患者由于条件所限, 仅用蟾蜍治疗, 获得良效。这单纯用泌尿生殖系的自然消退(Spontaneous Regression)观点是无法解释的。

患者取蟾蜍(除内脏外)煎汁口服、外用, 其药成分相当复杂, 一般与蟾酥相似, 在化学上属于甾族化合物, 总名为蟾蜍二烯内酯, 具有强心、兴奋、平喘、抗炎、抗肿瘤等多种作用。以蟾蜍内服外敷治疗胃癌、何杰金氏病、直肠癌、膀胱癌等已有报道。然未见对晚期睾丸胚胎癌治疗的报道。本例原发于右睾丸, 经淋巴转移至精索、腹膜后、纵膈及肺, 乃出现咳嗽、胸闷等一系列症状。服用蟾蜍煎汁后 2 个月右拇指甲下流脓汁, 服药 3 个月后停止流脓, 胸透见右肺转移病灶明显缩小, 症状消失。这仅是一种临床现象, 其作用机制尚待进一步观察和研究。

本例获得长期存活的原因可能为: 1. 蟾汁本身具有抗肿瘤药物效能, 阻止肿瘤的发展乃至消失。2. 综合性因素: 两次手术先后切除了原发病灶睾丸及转移淋巴结, 为长期存活创造了良好条件。另外, 病人的组织屏障机制与自愈能力, 切除一侧睾丸后雄性激素水平的变化, 免疫状态的改变都可能起作用。而蟾蜍的口服、外敷, 加速了肿瘤的消退进程。