

乌鸡白凤丸治疗慢性活动型肝炎报告

北京友谊医院内科消化组 卓焕慈 张秀梅 殷蔚美 王宝恩

乌鸡白凤丸为驰名中外治疗妇科疾病的中成药。其成分有乌鸡、鹿角胶（青蒿代）、鳖甲、牡蛎、桑螵蛸（覆盆子代）、人参、黄芪、当归、白芍等，具有益气补血、滋阴助阳、补益肝肾的功效。我们自1980年3~10月用乌鸡白凤丸治疗慢性活动型肝炎（按1978年杭州全国会议诊断标准）48例，获得较好疗效，并设对照组10例观察比较。现报道如下：

临床资料

一、一般资料

治疗组48例中，男25例，女23例；年龄21~56岁，平均年龄44岁；病程1~20年，平均病程4.2年。对照组10例中，男6例，女4例；年龄23~59岁，平均年龄38岁；病程1~19年，平均病程7年。

二、临床症状及体征

治疗前治疗组均有不同程度肝区痛、食欲减退和腹胀等胃肠道症状以及乏力、消瘦、低热等全身症状，肝大在右肋下1~2厘米13例，脾在左肋下0.5厘米6例。对照组也有类似症状，肝大在右肋下1~2厘米2例，脾均未触及。

治疗组中肝肾阴虚14例，肝郁脾虚23例，脾肾两虚2例，脾虚、气滞血瘀各1例，7例未辨证；对照组中肝肾阴虚4例，肝郁脾虚3例，脾虚1例，未辨证2例。

三、实验室检查

治疗组HBsAg阳性21例，其中e-抗原阳性3例，HBsAg阴性病例中抗-HBc阳性2例。对照组HBsAg阳性3例，HBsAg阴性病例中抗-HBc阳性1例。治疗组SGPT升高25例，平均值为265.7单位；TTT升高38例，平均

值为11.8单位。此外，单项BSP滞留量增高1例。对照组SGPT升高6例，平均值为286.7单位；TTT升高7例，平均值为12单位。两组中部分病例作了免疫球蛋白、活性E-玫瑰花结试验、肝血流图、甲皱微循环检查。

治疗方法和结果

一、治疗方法

治疗组48例服用北京市同仁堂制药厂出品的乌鸡白凤丸，每日3丸。对照组10例服用主要成分为虎杖和岗稔根的复方肝炎片（广东湛江制药厂出品），日服3次，每次3片；维生素E 10毫克，日服3次。两组疗程均为2~7个月。

二、近期疗效

治疗组治疗后症状消失10例，减轻33例，5例无变化；肝、脾缩小至正常者分别为6/10例、3/4例。对照组治疗后症状消失1例，减轻1例，其余无变化；治疗前肝大2例，治疗后1例自右肋下1.5厘米缩小为1厘米。另1例仍右肋下2厘米。

附表示治疗组SGPT、TTT、TFT恢复正常分别为11/25、7/38和5/32例。1例BSP试验异常者治疗后复常，而对照组仅1例TTT

附表 两组治疗前后肝功能变化比较

组 别		总 例 数	SGPT (单位)			TTT (单位)			TFT (单位)			
			< 130	130 ~ 200	> 200	0 ~ 5	6 ~ 10	> 10	-	+	++ ~ +++	+++
对照组	治疗前	10	4	2	4	3	3	4	5	0	3	2
	治疗后	10	4	2	4	4	1	5	0	7	2	1
治疗组	治疗前	48	23	11	14	10	14	24	16	0	14	18
	治疗后	48	34	10	4	17	14	17	21	0	14	13

复常,其他无变化或有恶化倾向。

免疫球蛋白,治疗组治疗后 IgG 复常者 8/11 例, IgA 和 IgM 分别为 4/13 和 6/13 例;活性 E-玫瑰花结试验,治疗前 3 例低下者治疗后均升至正常。对照组治疗前 IgG 增高者 3 例,治疗后 2 例仍高; IgA 增高 2 例,复查 1 例仍高; IgM 治疗前 3 例增高,治疗后 1 例降至正常;活性 E-玫瑰花结试验,治疗前低下者 1 例,治疗后恢复正常。

治疗组治疗后肝血流图恢复正常者为 10/16 例,但甲皱微循环血瘀征象消失仅 2/19 例,其余病例虽有不同程度的改善但未恢复正常。对照组治疗前肝血流图波型异常 3 例,治疗后仅 1 例复常。甲皱微循环治疗前异常 3 例,治疗后复查 2 例仍未复常。

我们按 1978 年杭州全国肝炎会议防治方案规定作为近期疗效判断标准,治疗组获显效者 19 例,好转 18 例,无效 8 例,恶化 3 例,总有效率为 77.1%。对照组 10 例中获显效者 1 例,好转 1 例,无效 5 例,恶化 3 例,总有效率 20%。说明乌鸡白凤丸治疗慢性活动性肝炎具有较明显的近期临床效果。治疗组中 HBsAg 阳性患者 21 例,除 1 例近期检测为阴性外,余均持续阳性,对照组 HBsAg 阳性 3 例均未阴转。

另有 4 例患者辨证属湿热内盛,服乌鸡白凤丸后因出现头晕和口干舌燥而停服;余均未见其他毒副作用。

三、远期随访

于 1982 年 8 月我们对本组病例进行治疗后 1 年 10 个月的远期随访观察。在治疗组获随访的 30 例中,肝功能仍正常者 7 例(显效 6 例,好转 1 例),肝功能继续有进步者 6 例(好转 2 例,无效 3 例,恶化 1 例),停药后肝功能波动但较治疗前为轻者 9 例(显效 6 例,好转 3 例),肝功能无好转或恶化者 8 例(显效 2 例,好转 5 例,无效 1 例)。对照组获随访的 7 例中,仅 2 例(无效 1 例,恶化 1 例)肝功能继续好转,余 5 例仍进一步恶化,而 HBsAg 阳性患者无一例阴转。

讨 论

乌鸡白凤丸原系治妇女体虚、月经不调、经行腹痛的验方,根据我们对慢性活动型肝炎的认识,绝大多数患者表现为虚证,其中部分为肾虚患者。由于乌鸡白凤丸有滋补肝肾、益气补血的作用,我们用该成药治疗有虚证表现的慢性活动型肝炎患者取得一定效果,经 1 年 10 个月的随访,有 43.3% 患者肝功能正常或继续有进步,但对 HBsAg 的转阴无明显影响。肝血流图和甲皱微循环检查表明,慢性活动型肝炎患者有瘀血征象,经治疗后有不同程度改善,推测乌鸡白凤丸有一定的活血化瘀功效。从临床观察来看,兼有湿热内盛者不宜服用乌鸡白凤丸。据北京市药检所和北京同仁堂制药总厂药研所对乌鸡白凤丸药理作用研究结果表明,它对垂体-肾上腺皮质系统和性功能有一定增强作用,能促使幼小胸腺萎缩,能明显减低正常大鼠肾上腺内维生素 C 的含量,并增加大鼠尿中 17 酮类固醇和 17 羟类固醇的含量,有促皮质素样作用。对切除肾上腺的幼鼠有保护作用,能明显提高切除肾上腺幼鼠的存活率,有盐皮质激素作用,它能促进去肾上腺和正常动物肝糖原的增积,又能对四氯化碳肝损伤引起的 SGPT 增高有明显的降低作用。初步提示乌鸡白凤丸能增强肝脏的解毒功能,促进肝糖原和蛋白质的合成和代谢,从而对肝损伤起保护作用。

本文的肝血流图、甲皱微循环由儿童医院传染科肝炎研究室协助完成,特此致谢。

* * * *

黄龙乌贼散治疗小儿脐疮

江苏省沛县杨屯中医诊所 王 宏 臣

笔者自拟黄龙乌贼散治疗小儿脐疮,疗效甚好。现介绍如下:

取川黄连二份,煅龙骨二份,乌贼骨一份,研细末,装瓶备用。

使用时用双氧水清洗脐部,用药棉拭干,将本品均匀铺撒疮面,用干净柔软之纱布包扎,每日换药一次。