

临 证 治 验 琐 谈

路志正讲述 高荣林 路京达整理

一、宣降肺气治癃闭

癃闭一病，医多责之于下焦，以湿热为多见，治以八正散之属。殊不知肺主气，为水之上源。若肺失宣降，则水道不通。疏上源以洁下流，则有提壶揭盖之妙。

曾治患者王某，女性，35岁。1982年5月4日于某院肛肠科行外痔切除术。术后4小时自行排小便两次，量约100毫升。其后自觉小腹胀满，尿道胀痛难忍，欲便不能。经鼻点匹罗卡品、针灸治疗，并令闻流水之声诱导，小便仍不下，痛苦万状。曾于当晚和翌晨各导尿一次，进服八正散加减数剂，并配合针刺治疗，未效。留置导尿管两天后恐继发感染，遂予拔除，邀余会诊。见病人仍不能自行排尿，尿道涩痛，小腹坠胀，大便不爽，舌苔黄腻，脉象滑数，此系湿热阻滞无疑。观前方为清热利湿，其辨治无误，何以无效？细思之，乃由方中缺少宣展气机、轻灵活泼之品。肺气闭郁，气化不行，故清利无功。遂以原方中加入杏仁宣降肺气，量用9克，后下。病人服药一剂，小便畅行，小腹坠胀感若失，大便亦爽。再进三剂以巩固疗效，痊愈出院。

二、疏风达邪发火郁

外感之初，其病在表，治宜疏散，此为常法。然表邪未解，迨与银花、连翘、大青叶、板蓝根等清热解毒之剂，致阳气闭郁，而成火郁坏病，似此临证每多见之。余遵《内经》“火郁发之”之旨，每以疏风达邪救治。

病妇任某，年40余，两月前感受外邪，见头痛、鼻塞、流涕、恶寒、无汗等症状，曾服用羚翘解毒丸而未愈。又进病毒灵、四环素、牛黄清心丸，以及大青叶、板蓝根、连翘、生石膏之属，致周身痒疹，尤以头面部奇痒难忍，

局部灼热，抓搔破溃结痂。病人心烦急躁，大便溏泻，舌质暗红，舌苔薄白，脉象沉细而数。此系外感风寒之邪，误用苦寒清热之剂，损伤脾阳，郁热内伏，而成火郁之证。即以疏风达邪、温中化湿之法。处方：防风9克，藿香6克（后下），羌活6克，炮姜3克，生黄芪12克，白术9克，地肤子10克，丹皮10克，薏苡仁15克，甘草6克，水煎服。药进三剂，微汗出，痒疹退，心烦除，大便已成形，诸症告愈。

三、调中健脾固滑脱

食滞胃脘，宜消导攻伐，此为常法。然人至老年，元气已衰，脾胃功能减弱，纵有实象，亦多虚中夹实，消导攻伐之品当属慎用之列。

刘某，年76岁，素体脾肾两亏，运化迟滞。1980年春节，偶进食炸馒头三小片，食后则自觉脘腹胀痛，不思饮食，欲便不能。病人自服木香槟榔丸，每服6克，两日之内连服三次。药后大便仍未能行，继服果导一片，一昼夜之内，泄泻竟达30余次，便下稀水，色如药汁，致脘闷堵塞，饮食不进，神疲气微，皮肤枯涩，求余诊治。诊见舌淡胖而苔白稍腻，脉象虚弦而数。此系脾气虚弱而运化无力，复过用消伐，脾胃大伤，遂投以香砂六君子汤加减。药后大便逐渐成形，泄注止而食纳增。

四、清肝除湿治不育

男子不育，一般多责之于肾，每以补肾填精、壮阳益火之法为治。壮年不育，肾虚宜补者固有之，此系先天禀赋不足所致。然壮年血气方刚，肾气充盛，而相火易动，或忍精不泄，致湿蕴蒸积，下归于肝肾。湿蕴热蒸，精液被灼而致不育者屡见不鲜。医者切不可概以不育为“肾虚”而滥投补益之剂。滋肾壮阳，助湿益热，病气反增，不仅无功，必受其害。

患者李某, 年近30, 婚后三年无子, 精液化验示精子数6000万, 活动者40%, 多方求治不效, 延余诊治。见病人面红目赤, 心烦易怒, 口苦咽干, 口中粘腻不爽, 渴不欲饮, 口唇及下颏承浆穴周围红色粉刺满布, 大便干结, 小便短赤, 甚则白浊, 舌暗红、苔黄腻, 脉象弦数有力。此系肝经湿热下注, 相火妄动, 煎熬肾精, 故精液量少, 遂致不育。治以泻肝清热、渗湿泌浊, 投龙胆泻肝汤加减。服药两个月后, 化验精子数增多, 死亡率大减, 其妻遂孕, 顺产一女, 至今健康。

五、三黄泻心止恶阻吐血

吐衄多由肺胃热盛, 迫血妄行所致。仲景大黄酒黄连泻心汤为治血热吐衄之一大法门, 人多用之。然妊娠吐衄者, 则一般多以大黄苦寒, 清热泻下, 活血破瘀, 走而不守, 惧其堕胎, 弃而不用。殊不知《内经》早有明训: “有故无殒, 亦无殒也。”只要辨证确切, 但用不妨。

病妇王某, 年30岁, 妊娠两月余, 病呕吐甚剧, 先呕出清水, 继则吐黄绿色粘液, 恶闻食臭, 仅偶可进少量稀粥, 自觉胃脘部堵闷灼热, 大便五日未行, 小溲黄赤。自昨日晚间, 突然吐血约50毫升。舌质红、苔黄腻, 脉弦滑而数。余以为此系妊娠后胎气上逆, 湿热阻滞, 胃失和降, 热灼血络所致。治以清热和胃、降逆止血之法, 方用大黄酒黄连泻心汤加味。处方: 大黄粉1克(分冲), 黄连4.5克, 黄芩6

克, 苏叶6克(后下), 刀豆子12克, 半夏9克, 郁金9克。两剂, 水煎后少量频服。药后吐血即止, 呕吐次数减少, 可进少量饮食。原方再进二剂, 呕吐止, 饮食复常, 病告痊愈而出院。后足月顺产一子, 母子平安。

六、启膈宣肺治失音

1981年末, 曾治一王姓患者, 男性, 54岁。自1981年7月起语音嘶哑, 同年8月24日以“咽部慢性充血, 声带息肉”, 予手术摘除。术后以息肉未净而症状依然, 相继又做了三次手术。至11月末, 又以“右声带前三分之一处隆起, 色淡, 余部充血”, 而以养阴清肺汤加减治疗近月, 症情不减。

病人身高体胖, 声微音哑, 面色晦黯, 性情烦躁, 头晕而重, 腰腿疼痛, 纳谷一般, 时感胃脘胀满, 咽喉紧而不爽, 神疲乏力, 口干烦渴喜饮, 晚间睡前饮水甚多。舌淡苔白滑, 脉虚弦而数, 按之无力。此系湿邪阻滞, 气机不畅, 痰瘀互结, 咽喉不利。治以启膈宣肺, 佐以活血化瘀, 用启膈散化裁。处方: 郁金10克, 丹参15克, 浙贝母10克, 荷叶6克, 羌活独活各10克, 柴胡6克, 防风10克, 白芷10克, 半夏15克, 茜草10克, 鸡血藤15克。药进三剂, 语音虽仍嘶哑, 但声域较前扩大。后以益气健脾, 补血活血, 化痰散结, 疏畅气机为治, 调理近月, 声音恢复正常。追访三年, 声带息肉未再复发。

大血藤治疗早期急性乳腺炎24例

洛阳市第一人民医院中医科 杨中学

大血藤又名红藤、大活血、大血通, 性味苦、平, 入胃与大肠二经, 除能清热解毒外, 兼有祛风活血功效。笔者于1978年9月至1980年11月, 应用本药在门诊治疗早期乳腺炎患者24例, 现小结如下:

一、一般资料: 本组24例均为产后不足2个月的妇女, 年龄24~43岁。病程1~18天, 其中1~5天者16例。患侧乳房红、肿、热、痛, 有肿块形成和明显压痛, 其中9例伴有发热、畏寒、头痛、恶心等全身症状。治疗前有19例检查血象, 其中15例白细胞

总数增高, 最高者达34500/立方毫米。本组有9例曾用青、链霉素或四环素、土霉素治疗1~9天因效果不著而转中医求治。

二、方法与结果: 一般用本药60克, 病情严重者用90克, 水煎2次, 每次30分钟, 分2次口服, 早晚各服1次。用本药观察治疗期间, 停用其它药物和疗法。

治疗后2⁺~4天痊愈者18例, 4⁺~6天痊愈者3例。共治愈21例, 好转2例, 无效1例。