

如巢元方《诸病源候论》云：“虚劳而咳嗽者，……令人胸背微痛。”肺结核常有胸背、胸胁疼痛，符合痰瘀互结，不通则痛的理论。唐容川论曰：“瘀血在腠理，营卫不和，则往来寒热；瘀血在腑，可见日晡潮热；瘀血在脏，证见骨蒸劳热。”可见骨蒸潮热，亦是瘀血的表现。咳嗽为瘀血阻滞气道，妨碍气机出入所致；咯血是离经之血，属于瘀血的范畴。肺结核病理过程中的血管内膜炎、血栓形成、干酪坏死、纤维组织增生及纤维化形成，构成了肺结核具有瘀血表现的现代医学病理基础，为活血化瘀治疗本病提供了科学指征。

经现代药理实验证明，活血化瘀中药主要有以下三方面的作用：(1)有扩张血管，增加血流量，改善血液循环作用⁽³⁾，如桃仁、鸡血藤、赤芍、红花、郁金等都有较明显的直接扩张血管和缓解血管痉挛的作用，可使缓慢的血流变为均匀连续的血流。(2)有抗凝和减少血液粘稠度、减少血流阻力作用，如鸡血藤、赤芍、丹参等有明显的抑制血小板聚集的作用⁽⁴⁾，对家兔血小板有解聚作用⁽⁵⁾，并可使全血粘度和全血还原粘度明显下降，血细胞表面电荷上升⁽⁶⁾；此外，如丹参、赤芍、桃仁及红花等尚有维持机体正常纤维蛋白溶解活性、降低血液粘稠度、减少血浆纤维蛋白原含量的作用。(3)能影响结缔组织代谢和抑制胶原合成，如鸡血藤、丹参、郁金等可使肉芽组织中纤维母细胞

内粗糙型内质网减少，胶原纤维分散稀疏，生化定量肉芽组织中胶原含量减少⁽⁷⁾。

基于对肺结核的病理特点及对以上活血化瘀中药药理作用的认识，我们组成中药“活化汤”治疗本病，以图达到扩张血管、增加血流量、减少血粘度、改善血循环、抑制结缔组织增生和缓解粘连、促进病灶吸收和空洞闭合、防止干酪坏死和纤维化病灶形成的目的。本组病例的试治结果表明，病灶的显著吸收率和空洞闭合率，中药加化疗的疗效均明显高于单用化疗者($P < 0.01$)，说明中药“活化汤”对浸润型肺结核的病灶吸收、空洞闭合有明显的作

参 考 文 献

- (1) 全国结核病防治会议：中华结核和呼吸系疾病杂志(1):62, 1978。
- (2) 王启明：中华结核病杂志(2):123, 1959。
- (3) 徐理纳等：新医药学杂志(5):38, 1976。
- (4) 中国医学科学院药物研究所活血化瘀治则研究组：新医药学杂志(2):33, 1976。
- (5) 中国医学科学院活血化瘀治则研究协作组：新医药学杂志(1):43, 1977。
- (6) 天津市中西医结合急腹症研究基础理论组：新医药学杂志(1):44, 1978。
- (7) 中国医学科学院活血化瘀治则研究协作组：新医药学杂志(2):32, 1976。

癃 闭 1 例 治 验

山东省文登县整骨医院中医科 王 承 训

王××，男，66岁，1978年3月3日初诊。

因“前列腺肥大”，小便淋漓，以至点滴不出，而入某医院。给予导尿管定时导尿，内服乙蔗酚及消炎药物治疗半月，好转出院。出院时仍保留导尿管。出院后第3天，导尿管自行脱出，继则小便点滴不通，小腹坠胀，痛苦不堪，来我院急诊。

诊见：患者辗转不安，坐卧不宁，小便点滴不通，小腹坠胀，频于入厕，欲便则无。舌质偏红、脉数而无力。癃闭之症，属气阴双亏。采用张锡纯《医学衷

中参西录》宣阳汤、济阴汤合用。处方：潞党参30克，威灵仙6克，麦冬18克，地肤子9克，熟地30克，生龟板15克，白芍15克。水煎服。

服上方1剂，小便稍通。继服2剂，小便即如泉涌。尽服4剂，诸症痊愈。

本例癃闭证属气阴两虚，张锡纯谓：“阳分虚损，气弱不能宣通，致小便不利。……阴分虚损，血亏不能濡润，致小便不利。”张氏主张二方并用，今遵此法，故能收效。