

本文主要研究了麻黄汤的解热、对腺体的影响、镇咳祛痰平喘等作用,同时与桂枝汤进行了比较。结果显示二者在降肛温、皮温、对唾液分泌、支气管分泌、扩张支气管作用等方面存在差异。同时结合实验结果,从中医理论及临床应用上讨论了麻黄汤、桂枝汤间的不同。

参 考 文 献

- (1) 田安民等:桂枝汤药理作用的初步研究。中成药研究(3):25, 1983。
- (2) 李宝华等:小白鼠泪腺的肾上腺素受体。中国药理学报(3):149, 1981。
- (3) 江西医学院药理室:小白鼠唾液肾上腺素能受体的观察。药理学实验指导(二)及实验技术讲义, 63页, 江西医学院印刷, 1980。
- (4) 徐叔云等:药理实验方法学。1版, 901页, 人民卫生出版社, 1982。

- (5) 南京药学院等:药理学实验指导。72、74页, 浙江医科大学印刷, 1980。
- (6) 徐叔云等:药理实验方法学。1版, 911页, 人民卫生出版社, 1982。
- (7) 马有度:医方新解。1版, 4页, 人民卫生出版社, 1982。
- (8) 王少华:桂枝在麻黄汤中的功用探讨。中医杂志(12):824, 1958。
- (9) 陈章荣等:麻桂伍用发汗机理探讨。福建中医药(1):34, 1966。
- (10) 中山医学院:药理学。1版, 117、153页, 人民卫生出版社, 1980。
- (11) 朱颜:中药的药理与应用。新1版, 130、140页, 人民卫生出版社, 1958。
- (12) 后藤实等:含麻黄的中药方剂的生理作用研究。日本东洋医学会志(1):311, 1973。
- (13) 时逸人:中国药理学。新1版, 196页, 上海科技出版社, 1958。

除 风 益 损 汤 治 疗 眼 外 伤

武汉市中医院眼科 刘 曙 东

除风益损汤出自元代倪维德《原机启微》一书。为治“为物所伤”而设。方由熟地、川芎、白芍、当归、藁本、前胡、防风组成。笔者临床用之屡效,兹报道以验证。

例一:许××,男,58岁,会计。

初诊日期:1968年4月3日,患者因双眼白内障于7日前行针拨白内障术,术中顺利,术后情况良好,第8日不慎左眼撞在椅子角,当时玻璃体出血,前房积血,视力顿失,即用50%葡萄糖加维生素C静脉注射,三七片口服,五天后,前房积血吸收,玻璃体出血不退,继用五天,出血仍不能吸收,改用除风益损汤,5剂见效,12剂出血全部吸收。矫正视力左0.8,右0.7。

例二:彭××,男,9岁,学生。

初诊日期:1972年6月5日,左眼被同学用弹弓打伤已14天。玻璃体出血,眼压升高,视力消失,当地驻军医院及市某医院用各种止血法,积血不能吸收。来我院治疗,住院后停止其他治疗方法。煎服除风益损汤20余剂后,玻璃体出血全部吸收,眼底清晰可见,眼压正常,视力1.2。

例三:李×,男,12岁,学生。

初诊日期:1974年2月5日,因放爆竹、炸伤左眼,致使该眼前房积血,虹膜根部断裂。其他医院

用安络血,止血芳酸,葡萄糖等药注射,口服云南白药,因疗效不佳,三天后来我院服中药诊治。未诊时,前房大量积血,角膜血染,不能窥见瞳孔,即服本方,局部用阿托品扩瞳,10余剂后,前房积血吸收,30余剂后角膜血染消失。虹膜复位,视力1.0。

例四:杨××,13岁,学生。

初诊日期:1983年9月12日,左眼被拳击伤三天,前房积血,视力光感。当地县人民医院用止血药及抗凝药无效。来我院治疗时,积血灌满前房,不能窥见瞳孔,混合充血,怕光流泪,给除风益损汤,5剂前房积血全部吸收,症状消除,视力恢复正常。

体会:本方适用于各种眼外伤出血及因外伤(包括手术)后充血和瘀血长期不退者。方中熟地、川芎、白芍、当归为四物汤,具有养血活血行气作用。中医认为凡损伤后风邪必乘皮肤之虚而入,故倪维德曰:“今为物之所伤,则皮毛肉腠之间,为隙必甚。所伤之际,岂无七情内移,而为卫气衰惫之源,二者俱召,风安不从。”所以方用防风、藁本、前胡以却风邪。又因风药多动,能加速血液循环,有利于积血之吸收。从笔者个人临床实践体会,凡积血或瘀血较重疼痛较剧者可重用川芎,当归改用归尾,赤白芍同用;凡流泪较多,羞明怕光,眼睑赤肿重者可重用防风、藁本。