

生组织主要由肉芽组织组成⁽⁴⁾。所以在创伤治疗过程中,促进肉芽迅速地但并非过度地生长,无疑可以加快创伤的愈合。祖国医学历来认为对于创伤或疮疡溃后,腐肉将尽之际,运用生肌药物可以促进肉芽生长,有利于伤后愈合。唐·孙思邈就说过“恶肉尽后,傅生肉膏散”可以“令好肉速生”⁽⁵⁾。历代医家在长期实践中创造了许多有效的生肌膏散,各地又经不断地改良加工,使生肌药物功效更著。本文的临床与实验资料表明,岳阳医院自订改良之八宝丹、生肌散有显著的促肉芽生长作用,因而有利于创伤的加快修复。

附方 1 四品散: 系我院老中医闻茂康根据古方三品一条枪改良而来。药用白砒 500 克、明矾 625 克、雄黄 75 克、乳香 187.5 克。先将砒、矾二药分别研成细末,入敞口之小罐或铁锅内,以炭火煅烧。待青烟去尽,出白烟时住火。罐置地上一宿,隔天将药研成细末,可得砒矾散约 500 克,加雄黄及乳香共研细末备用。该药以陈久者良,可减少局部的疼痛刺激。

痛刺激。

附方 2 生肌散: 上海中医学院附属岳阳医院自订方。方由制炉甘石 150 克、滴乳石 90 克、滑石 300 克、血珀 90 克、朱砂 60 克、梅片 18 克组成。研极细末,和匀备用。

附方 3 八宝丹: 岳阳医院自订方。方由煅石膏 300 克、东丹 30 克、珍珠粉 3 克组成。研极细末,和匀备用。

附方 4 生肌玉红膏: 岳阳医院自订方。方由小生地 120 克、生大黄 90 克、当归 90 克、丹皮 60 克、生甘草 60 克、紫草 30 克、番木鳖 30 克组成。上药置麻油 3 斤中,浸 7 天后,煎至药枯去渣,入黄白蜡各 60 克、轻粉 9 克,拌匀备用。

参考文献

- (1) 沈道修等:一种研究中西药抗炎作用的塑料环肉芽肿定量法。中西医结合杂志(3)1:49, 1983。
- (2) Peacock EE: Wound Repair. P 177, Second edition, W. B. Saunders Company, 1976。
- (3) 工业毒理学编写组:工业毒理学。216 页,上海人民出版社,1976。
- (4) 罗文:皮肤创伤愈合的过程和机理。病理学进展,45 页,贵州人民出版社,1980。
- (5) 孙思邈:备急千金要方。393 页,人民卫生出版社影印,1956。

地榆治疗咯血 136 例

湖南省桑植县人民医院 禹纯璞* 杨玉英**

我们用地榆治疗肺结核等咯血 136 例,收到较显著效果,现介绍如下。

一、临床资料:

136 例平均年龄 37.2 岁。病程 1~6 天 82 例,7~15 天 36 例,15 天以上 18 例,平均病程 10.2 天。

本组小量咯血(每日 100 毫升以内)63 例,中量咯血(400 毫升以下)42 例,大量咯血(400 毫升以上)31 例。

二、治疗方法:

临床将地榆制成汤剂或片剂备用。汤剂:取干地榆 3 公斤加水煎煮二次过滤,浓缩至 12000 毫升。成人每次 30 毫升(相当于生药 7.5 克),一日 4 次。儿童酌减。片剂:取地榆水煎制成浸膏压片,每片含地榆生药 1.5 克。成人每次 5 片,一日 4 次,待咯血停止,继用 2~3 天,以巩固疗效。因地榆含有鞣酸,服药时不要同服蛋白类饮食(如牛奶、鸡蛋等),以免影响有效成分的吸收。

三、病例选择:

凡进院咯血病人,不加选择地随机使用地榆汤或地榆片。其中浸润型肺结核 104 例,播散型肺结核 10 例,空洞型肺结核 13 例,其他型肺结核 3 例,支气管扩张 5 例,肺脓疡 1 例。

本组有 23 例,因用 6-氨基己酸止血无效而改用他药止血。

在治疗过程中,同时对原发病灶,进行相应的治疗,不使用镇静剂和止咳药物。不强调绝对卧床休息。

四、治疗结果:

服地榆汤者 74 例,服后咯血量明显减少,最后停止咯血定为有效者 72 例(97.3%),无效 2 例;服片剂者 62 例,有效 60 例(96.8%),无效 2 例。无效 4 例中,2 例因服药后恶心呕吐而停药,2 例因大咯血不止改用他药。在有效的 132 例中,于 1~3 天咯血停止者 67 例,4~7 天者 45 例,7 天以上 20 例,平均止血天数 4.2 天。临床观察到地榆亦有镇咳祛痰作用。

* 传染内科, ** 药剂科