

复常,其他无变化或有恶化倾向。

免疫球蛋白,治疗组治疗后 IgG 复常者 8/11 例, IgA 和 IgM 分别为 4/13 和 6/13 例; 活性 E-玫瑰花结试验, 治疗前 3 例低下者治疗后均升至正常。对照组治疗前 IgG 增高者 3 例, 治疗后 2 例仍高; IgA 增高 2 例, 复查 1 例仍高; IgM 治疗前 3 例增高, 治疗后 1 例降至正常; 活性 E-玫瑰花结试验, 治疗前低下者 1 例, 治疗后恢复正常。

治疗组治疗后肝血流图恢复正常者为 10/16 例, 但甲皱微循环血瘀征象消失仅 2/19 例, 其余病例虽有不同程度的改善但未恢复正常。对照组治疗前肝血流图波型异常 3 例, 治疗后仅 1 例复常。甲皱微循环治疗前异常 3 例, 治疗后复查 2 例仍未复常。

我们按 1978 年杭州全国肝炎会议防治方案规定作为近期疗效判断标准, 治疗组获显效者 19 例, 好转 18 例, 无效 8 例, 恶化 3 例, 总有效率为 77.1%。对照组 10 例中获显效者 1 例, 好转 1 例, 无效 5 例, 恶化 3 例, 总有效率 20%。说明乌鸡白凤丸治疗慢性活动性肝炎具有较明显的近期临床效果。治疗组中 HBsAg 阳性患者 21 例, 除 1 例近期检测为阴性外, 余均持续阳性。对照组 HBsAg 阳性 3 例均未阴转。

另有 4 例患者辨证属湿热内盛, 服乌鸡白凤丸后因出现头晕和口干舌燥而停服; 余均未见其他毒副作用。

三、远期随访

于 1982 年 8 月我们对本组病例进行治疗后 1 年 10 个月的远期随访观察。在治疗组获随访的 30 例中, 肝功能仍正常者 7 例 (显效 6 例, 好转 1 例), 肝功能继续有进步者 6 例 (好转 2 例, 无效 3 例, 恶化 1 例), 停药后肝功能波动但较治疗前为轻者 9 例 (显效 6 例, 好转 3 例), 肝功能无好转或恶化者 8 例 (显效 2 例, 好转 5 例, 无效 1 例)。对照组获随访的 7 例中, 仅 2 例 (无效 1 例, 恶化 1 例) 肝功能继续好转, 余 5 例仍进一步恶化, 而 HBsAg 阳性患者无一例阴转。

讨 论

乌鸡白凤丸原系治妇女体虚、月经不调、经行腹痛的验方, 根据我们对慢性活动型肝炎的认识, 绝大多数患者表现为虚证, 其中部分为肾虚患者。由于乌鸡白凤丸有滋补肝肾、益气补血的作用, 我们用该成药治疗有虚证表现的慢性活动型肝炎患者取得一定效果, 经 1 年 10 个月的随访, 有 43.3% 患者肝功能正常或继续有进步, 但对 HBsAg 的转阴无明显影响。肝血流图和甲皱微循环检查表明, 慢性活动型肝炎患者有瘀血征象, 经治疗后有不同程度改善, 推测乌鸡白凤丸有一定的活血化瘀功效。从临床观察来看, 兼有湿热内盛者不宜服用乌鸡白凤丸。据北京市药检所和北京同仁堂制药总厂药研所对乌鸡白凤丸药理作用研究结果表明, 它对垂体-肾上腺皮质系统和性功能有一定增强作用, 能促使幼小胸腺萎缩, 能明显减低正常大鼠肾上腺内维生素 C 的含量, 并增加大鼠尿中 17 酮类固醇和 17 羟类固醇的含量, 有促皮质素样作用。对切除肾上腺的幼鼠有保护作用, 能明显提高切除肾上腺幼鼠的存活率, 有盐皮质激素作用, 它能促进去肾上腺和正常动物肝糖原的增积, 又能对四氯化碳肝损伤引起的 SGPT 增高有明显的降低作用。初步提示乌鸡白凤丸能增强肝脏的解毒功能, 促进肝糖原和蛋白质的合成和代谢, 从而对肝损伤起保护作用。

本文的肝血流图、甲皱微循环由儿童医院传染科肝炎研究室协助完成, 特此致谢。

* * * *

黄龙乌贼散治疗小儿脐疮

江苏省沛县杨屯中医诊所 王 宏 臣

笔者自拟黄龙乌贼散治疗小儿脐疮, 疗效甚好。现介绍如下:

取川黄连二份, 煅龙骨二份, 乌贼骨一份, 研细末, 装瓶备用。

使用时用双氧水清洗脐部, 用药棉拭干, 将本品均匀铺撒疮面, 用干净柔软之纱布包扎, 每日换药一次。