

柯碱的数万倍。当然,动物药的活性成分较植物药更为复杂。它们的药理作用基质,往往与具有特异作用的蛋白质、多肽、氨基一类有关。有的具激活性,有的具酶活性。例如胎盘,即兼具这两种活性。此外,动物药也含有多糖、生物碱、甾类化合物、萜烯类衍生物、芳香族化合物等。

我国地大物博,有很多动物资源可供药用。当然,考虑到自然界的生态平衡及野生动物资源的保护,应防止滥捕,对国家公布的各类保护动物还应加以保护。

同时,也要加强对药用动物养殖问题的研究,并努力推广成功的经验。目前,对麝、各种鹿、小灵猫、海马、蜈蚣、蝎、蜜虫、珠蚌(以三角帆蚌为主)、石决明等均已开展养殖。对海岛放养动物药(如蜈蚣、蝎蛇等)的经验,尤应加以重视。尽管药用动物的研究已受到各方面的重视,但由于基础较薄弱,故目前就多数情况来看,尚须从调查资源、收集验方、临床验证做起,配合动物的分类区系、药理实验、化学分析、提取精制等方面,继续深入研究。

中医药治疗老年性下肢臃疮22例

湖南中医学院附属第一医院外科 刘维善

一、临床资料:本组22例,男19例,女3例;年龄60~78岁;病程2~10年以上;均反复发作,尤以秋冬多见;合并下肢静脉曲张15例,有外伤病史者16例,患过下肢丹毒7例,并有湿疹者6例,均无癌变;两足交替出现臃疮者2例,单侧者20例;内臃13例,外臃9例;左下肢8例,右下肢14例;臃疮最小者1.5厘米,最大者4×5厘米。

二、辨证论治:1. 湿热下注型(5例),主症:下肢静脉曲张,内外臃破损染毒,皮肤焮红稍肿胀,灼热疼痛,溃口皮肉糜烂,时瘙痒,脓水淋漓,或黄或粘,或流血水,溃口陷凹,久则边如缸口,色淡或暗红,复因染毒,脓水恶臭,毒水浸淫,溃口增大,迁延日久,时愈时发,或有口苦,脉弦带数或弦而滑,舌边红或尖红,苔黄等。证属:湿热下注筋脉,凝结不散,郁久发热,热盛肉腐,肉腐成脓,脓不得泻则烂筋。治以:清利湿热,疏通经脉兼以补益肝肾。内服药方:银花30克,防风12克,连翘10克,蝉衣6克,穿心莲30克,地肤子12克,生黄芪30克,寄生10克,续断12克,木通10克,前仁10克,草薢10克,川牛膝10克,赤芍10克,甘草10克。外用洗方:防风15克,艾叶15克,蛇床子15克,贯仲15克,淫竹消15克,蝉衣10克,大黄30克(后下),银花藤30克。煎水洗患肢和溃口。外贴金如意软膏纱布,每日更换一次。2. 气血瘀滞型(17例),主症:面色黧黑或无华,下肢酸胀,麻木或有沉重感,皮色紫暗,青筋盘曲,行走乏力,臃部稍有碰破则出血难止,溃口周围皮色暗褐,不痒,流黑色血水,绵绵不断,久不长肉,形如缸口,逢秋冬患肢脱屑如面粉,迁延难愈,舌淡边紫暗少苔,脉沉紧或滑。证属:寒湿客于下肢筋脉,气血瘀滞凝结不散,筋脉失养。治

以:行气活血,燥湿除寒,兼以补益肝肾,濡养筋脉。内服药方:桃仁10克,红花6克,丹参10克,鸡血藤12克,乌药15克,血竭6克,制乳没各6克,归尾10克,桂枝6克,苍术10克,生黄芪15克,杜仲10克,木瓜10克,川牛膝10克,甘草6克。外用:先用三黄洗剂冲洗创口,后用矾冰液温敷(我院自制),形如缸口者剪除。

三、治疗结果:湿热下注型5例,最短15天,最长45天,平均30天愈合;气血瘀滞型17例,最短12天,最长60天,平均36天愈合。除2例第2年轻度复发外,余均治愈,有效率达90.9%,4例缓解后行患肢大隐静脉结扎术。

四、小结:明·陈实功《外科正宗》曰:“臃疮者,风热湿毒相聚而成,有新久之别,内外之殊。”客邪留恋下肢筋脉,气血凝滞,或以热化,或从寒凝,或耗中元,故当辨证求因,审因论治,遵循标本缓急,先治其标,后治其本,如湿热下注型,先清利湿热,疏通下肢筋脉,后补益肝肾,达到强筋壮骨,皮肉乃生。对于气血瘀滞型,行气活血,尤为先导,正如清·王清任《医林改错》曰:“气愈补血愈瘀,血瘀气更不能达于皮肤,用行气破血之剂,通开血道,气直达于皮肤。”临床实践证明,行气活血有利于血管的扩张,气血的运行,可促进溃口皮肉新生。下肢臃疮恢复缓慢,患处溃口容易染毒,故内外同治是必要的。尤其对于迁延日久,溃口瘢痕组织增生,边如缸口者,手术剪除扩大创面,有利于气血运行,缓解肿胀,加速皮肉的重建。因老年人内脏器官多有不同程度的退行性变化及气血虚弱,故在下肢臃疮修复期,适当的补益肝肾,可有利于提高老年人的抗病免疫机能,这对防止臃疮复发有一定的意义。