

因而它对于认识某些事物及疾病变化的客观规律性,具有一定的辩证法思想,在某些方面,可以补阴阳学说之不足。

标本既代表着某些事物对立的双方,则必有一方所处的地位是主要的,因而在治疗方面,必须根据病变双方的地位确定治疗原则。但标本双方所处的地位,也不是固定不变的,而是有所变动,《内经》中所谓“标本相移”,就具有这样的意义。

后世医家根据《内经》这一学术思想,对祖国医学

中的许多问题,如正与邪、病因与症状、先病与后病、原发病与继发病、内脏病与体表病、久病与新病等矛盾双方,都以标本加以概括说明,并根据标本双方所处的地位,确立先标后本、先本后标或标本兼治等治疗原则,对临床有一定的指导意义。若标本不清,往往导致主次不明、缓急不分等治疗上的错误。从而看出《内经》中有关标本问题的精神实质,在于说明某些客观事物对立双方的相互关系和所处的地位,和阴阳学说一样,具有朴素的辩证法思想。

枯息液治疗浅表恶性肿瘤的临床观察

湖南省邵阳县塘田市医院 粟 明

我院自 1978~1984 年运用中药枯息液治疗浅表恶性肿瘤患者 30 例,疗效尚好,现报道如下。

一、临床资料: 本组 30 例,男 21 例,女 9 例;年龄 17~78 岁,平均 49 岁;病程 2~216 个月,平均 51 个月;其中早期 3 例,中期 13 例,晚期 14 例。本组 30 例患者均经省(8 例)、地(22 例)医院活检后确诊为浅表恶性肿瘤,其中鳞状上皮细胞癌 11 例,基底细胞癌 5 例,恶性黑色素瘤 3 例,纤维肉瘤 6 例,血管肉瘤 3 例,神经纤维肉瘤 2 例。

二、治疗方法: (一) 药物与制作: 方一: 山苍子挥发油 100 毫升煮沸备用; 方二: 斑蝥 150 个加入 75% 酒精 100 毫升浸泡 7 日后过滤,得滤液 30 毫升煮沸备用,应用时用斑蝥浸出液 3 毫升与 20% 氢氧化钠 7 毫升混匀(每毫升含生斑蝥 1.5 个)后立即使用; 方一、二统称为枯息液(代号“101”,一为“101”1 号,二为“101”2 号); 方三: 臭牡丹、桉木叶各 100 克,加清水 1000 毫升煎煮 2 次,得滤液约 400 毫升用作消毒液; 方四: 白砂糖 300 克,活蚯蚓 50 克捣烂成泥,加山苍子挥发油 1 毫升混匀备用; 方五: 万应膏(市售)备用。

(二) 使用方法: 根据肿瘤的部位、浸润程度与预后,分别采用不同的药切范围。如瘤基侵犯较深,可采用肿瘤所在部位的肌肉、肌腱、神经、血管(重要血管忌用)等组织的瘤基底血管外注射“101”巢蚀;若瘤基侵犯较浅,可在肿瘤所在部位的皮肤、脂肪等组织的瘤基血管外注射“101”围蚀。其用量、疗程及次数,应取决于肿瘤的侵犯程度,一般瘤体在 $1 \times 1 \times 1 \sim 15 \times 15 \times 3$ 厘米内可用“101”1 号 5 毫升、2 号 0.5~30 毫升,疗程 12~270 分钟,待瘤体变黑枯结后,

在距正常组织 0.5~0.7 厘米处切除,应一次腐尽(如有残留者,可次日用少量 101 再腐蚀);遗留腔隙用方三消毒后,再用方四、五每日换药 1 次,直至痊愈。

三、治疗结果: 本组 30 例,临床治愈(瘤体消失、创面愈合,1 年内未复发) 24 例(鳞状上皮细胞癌 10 例,基底细胞癌 4 例,恶性黑色素瘤 1 例,纤维肉瘤 6 例,血管肉瘤 3 例),占 80%;好转(瘤体基本消退,但 6 个月后又有所增长) 4 例(恶性黑色素瘤 1 例,神经纤维肉瘤 1 例,基底细胞癌 1 例,鳞状上皮细胞癌 1 例),占 13%;无效(瘤体消退不足 6 个月复发) 2 例(恶性黑色素瘤 1 例,神经纤维肉瘤 1 例),占 7%;总有效率达 93%。本组病例平均住院 69 天,治愈 24 例中除 1 例恶性黑色素瘤患者 1 年后部分复发,余 23 例经 41 个月随访均未复发。

四、讨论: 枯息液中的斑蝥主要含斑蝥素,与氢氧化钠同用具有强烈的腐蚀作用,可直接杀灭癌细胞,并促使其灶基组织迅速变性、萎缩、坏死,从而阻断瘤体血运。主要致毒物斑蝥素硷化后,溶解度增加,毒性减低,且由于腐蚀灶周围水肿,形成“液墙”,从而控制了腐蚀的范围,加之方四的解毒作用,故不致造成远端血管栓塞坏死。但若瘤体药切不彻底,残留瘤组织很容易再次生长,故应一次切除干净。经实验证明“101”1 号 < 5 毫升、2 号 < 30 毫升,其入瘤药切面 $< 15 \times 15$ 厘米为应用完全指标,若剂量或药切面积大于此指标,则可能出现胃肠道症状等反应。对孕妇、肺心病、肾衰及严重感染的患者当忌用。本方法具有巢蚀瘤体而无出血,且能防止肿瘤的医源性播散,腐程短而无剧痛,适应范围较广泛等优点,故具有较大的实用价值。