

4年, 4年内未复发者100例, 占89.3%; 复发12例, 占10.7%。复发时间1~2年4例, 2+~3年5例, 3+~4年3例。复发后再次接受治疗, 短期内仍能获效。

四、讨论

银屑病目前仍为原因不明的皮肤病之一。本病以青壮年之发病率为最高, 有些学者认为本病伴有微循环功能障碍⁽¹⁾, 亦有人认为其血液流变学指标也有病理性改变⁽²⁾, 且随着银屑病类型、病情的不同而异。我们对本组患者中的192例做了肝血流图检查, 发现有明显的肝静脉波及门脉波升高者占29.2%, 提示部分银屑病患者肝脏血液瘀滞, 回流受阻, 有机能性门脉高压。据此我们重用了活血化瘀的中药来治疗本病, 并取得了较好的效果。

我们对血热型及有明显感染者使用了具有

杀菌、抑菌及抗病毒作用的清热解毒药物, 对血瘀型患者(肝血流图常示异常)重用了活血化瘀药物, 对其他两型患者也相应使用了上述两类药物。上述两类药物作用比较广泛, 可调节机体反应性, 改善全身及局部的血液循环, 直接或间接起到抗炎的效果⁽³⁾, 在同时配合外用保护性泥膏或软膏的情况下, 可获得较好的疗效, 且复发率很低, 是一种值得进一步探讨的治疗方法。

本文肝血流图检查是由本院肝血流图室李茂松同志协助完成, 特此致谢。

参 考 文 献

- (1) 刘承煌等: 中华皮肤科杂志(11):311, 1965。
- (2) 刘承煌等: 临床皮肤科杂志(6):284, 1983。
- (3) 秦万章等: 新医学杂志(6):11, 1975。

电 针 治 疗 中 风 舌 强 语 蹇 12 例 报 告

江苏省镇江市精神病院 钱 济 峰

中风引起的舌强语蹇是比较常见的缠绵难治的病症, 笔者运用电针治疗12例, 疗效尚称满意, 现报告如下。

一般资料: 临床观察34例中风偏瘫患者, 出现舌强语蹇者占12例, 其中男性9例, 女性3例; 年龄最小30岁, 最大66岁; 病程最短半个月, 最长20个月。根据神经科诊断, 其中因脑溢血引起者3例, 脑血栓6例, 脑栓塞3例。主要症状为舌强语蹇, 伸舌困难或左右偏歪, 舌尖卷曲于唇内。12例均伴有半身不遂等症。

治疗方法: 取穴: 廉泉、通里、合谷、内关。手法: 廉泉穴采用平补平泻法, 即进针后均匀捻转提插。其余穴采用捻转补泻, 即捻转幅度小、速度慢用力轻揉为补, 反之则为泻法。使用沪产G6805型治疗仪, 采用疏密波, 电量逐渐递增, 以患者能耐受为度, 每日一次, 每次20分钟, 每次选用上述二穴, 交替使用。

治疗结果: 基本痊愈8例(指舌肌运动恢复自如, 言语清楚); 显著进步2例(指舌肌运动尚可, 言语

尚清楚, 但欠流畅); 好转2例(指舌肌运动仍受限, 治疗后可发单音)。痊愈的8例均随访1年以上, 最长者1例随访6年, 情况良好。

典型病例: 朱×, 女性, 49岁, 农民, 已婚, 住院号19038。于6个月前, 饮酒后手指麻木, 随即昏倒, 面色潮红, 伴呕吐。入当地公社医院后, 意识不清达5日之久, 经及时抢救而脱险。又因中风后遗症入本院神经科治疗。体检: 神清, 血压150/100毫米汞柱, 鼻唇沟左侧变浅, 嘴歪向右侧, 左口角流涎, 舌强语蹇伸舌困难。舌质红、苔厚腻, 脉洪。神经系统检查: 左下肢肌力III°, 左上肢肌力0°, 巴氏征左侧(+), 霍夫曼氏征左侧(+), 膝反射左下肢亢进, 踝阵挛左侧(+), 诊断为脑溢血后遗症。选用上述二穴, 仅电针5次即伸舌正常, 言语清楚, 偏瘫肢体亦有恢复。

按: 本组选穴意义如下, 廉泉穴属任脉, 有通舌络利咽喉作用, 为近人经验效穴。通里穴以清心神而开机窍。内关穴为手厥阴之络, 能调整三焦之气, 清心包泄邪热, 宽胸和中。合谷穴以泄阳明之热。