

来选择的。若按某一药物的作用来解释疗效，往往是复杂的。如清热药(银花、连翘、黄芩、黄连等)多具有抗菌作用，虽本病无明确感染病因，但这些药物临床上的退烧消炎作用是明显可见的，也有防治继发感染的作用；而利湿药(如茯苓、泽泻、滑石、木通等)对消肿及减少渗液有明显的作用，也对防治皮质激素引起的高血压有利；滋阴药(如生熟地、黄精、元参等)用于久病伤阴见证，对调整机体免疫功能是有作用的，特别是对长期大量应用皮质激素的病人可防止激素反馈引起垂体萎缩，已为实验报告所证实。⁽⁵⁾虽然目前看来仅用中药还不能控制重症天疱疮及类天疱疮的病情，但其改善症状、减少激素副作用和增强体质的作用则是可以肯定的。本组病例中1例红斑性天疱疮未用激素，单以中药为主治疗也获治愈就可证明。

自应用皮质激素治疗天疱疮及类天疱疮以来，其预后虽大为改善，但有报告其死亡率仍高达40%左右。⁽⁶⁾本组死亡率为9.1%(2/22)，显效者为68.2%(15/22)，有效者为22.7%(5/22)，说明中西医结合治疗优于单用皮质激素治疗。但如何更加客观地评价中西医结合的作用，特别是中药的作用，还需要进行细致的工作。

参 考 文 献

- (1) 巢元方等：诸病源候论。卷35，187页，人民卫生出版社影印，1955。
- (2) 清·吴谦等：医宗金鉴·外科心法要诀(总1961页)409页，人民卫生出版社，1973。
- (3) Freedman SO：临床免疫学。78~79页，福建医科大学(中译本)，1975。
- (4) Lever WF：Histopathology of the skin.p 107~118, 5th edition, 1975。
- (5) 沈自尹等：上海第一医学院学报(6)5:313, 1979。
- (6) 尤刚：中华皮肤科杂志(4):266, 1964。

调 心 汤 治 疗 早 搏 18 例

江苏省高邮县人民医院中医科 薛 中 理

近年来，以自拟调心汤治疗早搏，收到较满意效果，现将治疗在3个月以内的18例，报告如下：

临床资料：18例中女性11例，男性7例；10~19岁者4例；20~29岁者8例；30~39岁4例；40岁以上2例。病程在1个月以内者10例；2~3个月者4例；4~6个月者2例；7~10个月者2例。发病前均有明显的外感史。

治疗方法：以调心汤为主，原则上不用西药。方由丹参15~30克，紫石英20~30克，党参15~30克，生地15~20克，麦冬10~15克，川芎10~15克，炙甘草9克，连翘10克，桂枝3~6克组成。症状较重或开始治疗时每日1剂半，水煎，日3服，减轻后日1剂；恢复期2日1剂。

治疗结果：基本痊愈：症状消失、心电图恢复正常者16例；有效：心电图改善、但有反复者1例；无效：症状改变不明显、心电图无改善者1例。

病案举例：朱××，女，20岁，某医院护士，1982年4月6日初诊。胸闷、心慌50天。病前1周

鼻塞、流涕、咽痛，自服板蓝根冲剂、复方新诺明2天，感冒好转，但胸闷、心慌，左胸部有隐痛感，头晕，乏力。检查：心音低钝，心率70次/分，律不整，闻及早搏10~12次/分，无杂音，心脏不扩大。心电图检查：窦性心律不齐、频发室性早搏。拟诊为病毒性心肌炎收住医院治疗50天，症状改善，但早搏仍频发。自动出院，停用西药，前来我处治疗，口服调心汤50剂，早搏消失，观察2年，未见复发。

体会：本组病例可能属于病毒性心肌炎之早搏，属于祖国医学“脉结代，心动悸”范畴。其发病机理主要由病毒之邪外侵，迁延失治，耗伤气血，荣卫失调所致。临床以心阴不足、心气失养为主要表现，故用益气养阴、清心降火、活血化瘀的调心汤治疗，其中党参益心气、安心神；丹参养心血、化瘀血、清心除烦；紫石英为镇怯润枯之品，实心悸之要药；生地、麦冬清心降火，养阴生津；川芎消瘀血；炙甘草通经脉、甘温益气；连翘泻心经客热，清解余邪；桂枝用量独轻，借其通阳之性，更有助于气阴恢复。