

21.3%；治愈后指部功能恢复正常者 59 例，占 78.7%。

四、典型病例

张×，男，8岁，1976年7月初诊。患儿半月前右手中指、无名指、小指被狗咬伤，经治疗后中指、无名指伤口愈合，唯小指伤势逐渐加重，经某医院X线摄片检查，示小指中节指骨粉碎，第一节指骨发炎，建议行全指截除术，因家长不同意，遂转我院就诊。检查：右小指内侧三处伤口相连，溃疡面积超过小指面积的一半，中节几乎脱落，肿势延及手背，探查时触及碎骨摩擦音，腋下可触及肿大淋巴结。诊断为外伤性化脓性骨髓炎。治则：化痰消肿、提毒祛腐。疮口敷祛腐散，周围贴化痰消炎膏，外侧以小夹板固定。连续3天换药后，肿势渐消，疼痛减轻，疮口插入2号枯管钉2

根，上药继续敷用。3天后腐肉脱落，镊取出3片大小不等的碎骨，外敷生肌膏，小夹板继续固定2周获愈。小指形成弯曲形状（因中节指骨完全取出），随访至1984年底未复发。

五、体会

指部慢性骨髓炎，属中医伏骨结毒的范畴，其病机多为热毒结聚，阻滞经络，流窜入里，伏骨而生，腐筋烂骨，日久不愈，形成窦道。本病内服中药难达病所，故应以外治法为主，治疗可分为三个阶段。第一阶段应以清除局部蕴毒、散瘀消肿为主，敷以化痰消炎膏、千槌膏、祛腐散等；第二阶段则以根治法为主，药用1、2、3号枯管钉等，以提毒祛腐；第三阶段以恢复指部功能为主要目的，药用冲和膏等。本疗法简便易行，效果满意，体现了中医外治法的长处。

健儿散预防小儿上呼吸道感染 352 例初步观察

内蒙古自治区中蒙医院儿科 陈 杰 张若兰 姚昌云* 朋子杰

根据祖国医学“不治已病治未病”的精神，我们于1979年试用健儿散预防小儿上呼吸道感染，临床疗效很好。至1982年统计完整病例352例，总有效率为93.2%。现分析如下：

一、临床资料：本组352例中，以往每年患上呼吸道感染10次以上患儿186例（52.8%），5~9次者164例，4次者2例。其中男188例，女164例。年龄7个月~13岁，其中7个月~3岁151例，4~6岁103例，7~13岁98例。本组患儿中有消瘦者133例，大便干燥者131例，便次多、便稀者45例，纳差者155例。

二、药物组成及服法：本方由人参、五味子、川贝（3:2:1）组成，研为细末，制成散剂或水丸、糖衣片备用。3岁以下每次服0.3克，4~6岁0.6克，7~10岁1克，11~14岁1.2克，每天服2次。一般需连续服用30~60天。于夏季服药。

三、预防结果：本方于第一年夏季服药，于第二年春季随访，判定疗效。

显效（服药后上呼吸道感染次数与服药前同期减少2/3以上、或减半，发病时咳嗽等症明显减轻，饮

食增加，体质增强）118例（33.6%），有效（服药后上呼吸道感染次数比服药前同期减半或略有减少，且发病时症状减轻）210例（59.5%），无效24例（6.8%）。总有效率93.2%。服药15~20天获显效者占23.1%，21~40天者占33.9%，41~60天者占43.3%。可以看出服药时间愈长，显效率愈高。

在上呼吸道感染减少的同时，患儿纳食增加者114例，大便转为正常者65例，自汗减少或消失者51例。

四、体会：本方由人参、五味子、川贝组成，具有益气健脾，养阴清肺，扶正固表之功效。本组患儿多系脾肺不固，或肺热，而易患上呼吸道感染。服用本方药后可助脾肺之气，固腠理，增强抗病能力。人参、五味子均有促进免疫功能之作用。从临床观察来看，多数患儿服本方后，上呼吸道感染减少，且纳食增加，大便复常，自汗消失，疗效较满意。本组病例未设对照组，以易感儿自身服药前后同期感冒次数相比较，因此，本方之确切疗效有待今后继续验证。

* 已调离本单位