

床也有部分病人易于反复发作。我在临床摸索,方名炙甘草汤,当以炙甘草为主药,故加重炙甘草之量以试之,有的病人需重用至21克,甚至用到30克才能收效,故我对有些顽固之过早搏动,反复出现二联律、三联律者,应用各种西药少效,炙甘草常一开始即用21克,方中加入茯苓、泽泻各9克,以减少甘草之滞钠排钾作用,一般长服也无副作用,直可用至早搏消失一个月以后再缓缓停药,即先隔日服一剂,再三日服一剂,直至停药。常可使不少顽固性早搏获得痊愈。对部分用药不效者,加用验方苦参3~4.5克或常山6~9克,也有一定疗效。

曾治一女性患者,患病毒性心肌炎后,反复出现频发室性早搏,有时呈二联律,经用各种西药均无效,后住入中西医结合病房,用中西药物结合治疗,开始尚有效,但在一次劳累后又发,再用静脉滴注利多卡因无效。后我停用一切西药,用炙甘草21克,党参12克,麦冬10克,桂枝1.5克,枣仁10克,当归12克,

生地12克,茯神12克,珍珠母30克,龙齿15克。仅服一剂,早搏消失,以后用此方巩固一月出院,后未再发。

对由于病态窦房结综合征引起的心动过缓,我常用党参12克(最好用生晒参4.5~6克),淡附片9克,枳实9克,桂枝9克,炙甘草9克,我自起一名“健心汤”,可温通心阳,兼补心气,有助宗气推动之力,对加快心率有很好的疗效,有时加用丹参、川芎、桃仁、红花活血化瘀,相辅相成,疗效更好。

对心房纤维性颤动,其脉律绝对不规则,时快时慢,时强时弱,时有时无,临床用切脉可以辨病,其正确性可达90%以上,此病属元阳衰微,心气大伤,我用上述“健心汤”加淮小麦30克,龙齿15克,珍珠母30克,柏枣仁各9克,丹参30克,白边万年青9克。曾有数例使心律转为窦性,但劳累后易复发,故应在心律转正常后,仍继续用药一段时间,复发者再用仍有效,一般有效者在服用一个月内即见效,不效者可停用。

中药英蜂膏治疗外科皮肤感染83例

中国人民解放军第145医院外一科 褚福成

为了提高对外科皮肤感染的治疗效果,我科筛选了10余种具有清热、解毒、活血、消肿的中草药配制成“英蜂膏”,外用治疗皮肤感染,现报道如下。

一、临床资料:83例患者中四肢软组织感染23例,疖肿25例,急性颌下淋巴结炎9例,掌间隙感染7例,丹毒9例(其中3例体温39℃以上),黄水疮4例,颈部痈及无名肿毒各3例。

二、治疗方法:英蜂膏由蒲公英、蜂窠各30克,当归、乳没各12克,白芷、生地、血竭、红粉、冰片各10克,黄柏、大黄各15克,蜈蚣5条,蟾酥2.4克,蜂蜡60克,香油500毫升组成。将上药(除血竭、红粉、冰片、蜂蜡)放入沸油中炸枯去渣,炼油滴水成珠,放入蜂蜡,待油冷却时放入血竭、红粉、冰片,搅匀成膏,装瓶备用。本药适用于早期之疖、痈、疮、急性淋巴结炎、软组织感染、无名肿毒、丹毒、黄水疮等,若已合并全身感染者,则应同时配

合应用抗菌素。使用时将本药涂于患处,外盖纱布即可,一般每日涂药一次。

三、治疗结果:83例患者全部治愈,其中掌间隙感染7例平均用药9天,黄水疮4例平均用药4天,疖肿25例平均用药6.2天,四肢软组织感染23例平均用药8.1天,急性颌下淋巴结炎9例平均用药8天,无名肿毒3例平均用药7.5天,颈部痈3例平均用药7.5天,丹毒9例平均用药8.2天。凡体温超过39℃者均同时配合应用了抗菌素治疗。

四、小结:英蜂膏对于早期未成脓之皮肤感染有解毒、活血、消肿、止痛之功效,疗效迅速,使用方便,尤对小儿脓疱疮效果更佳,一般上药2~3次即愈。对于合并全身感染者应配合使用抗菌素。本组病例中除2例用药后产生皮肤过敏现象外,余均无不良反应,2例过敏患者经用生理盐水洗净、停药后,皮损消失。