

中医治疗不孕症及崩漏的临床分析

山东省威海市立医院 周淑英

活血化痰及清热解毒药物,有助于子宫内膜的周期性更新与炎症的消退。月经来潮时服药,更可通过药物作用,促进子宫的收缩、子宫内膜的脱落与新生,从而起到消除妇科炎症、改善宫腔内环境、创造新的床面、有益于孕卵着床及子宫内膜修复的作用。这种药物治疗法似有“刮宫”之效,临床上常用来治疗炎症引起的不孕症及崩漏、产后宫缩无力所致恶露不尽、刮宫术后阴道出血淋漓不尽者,均能收到较好的效果。现分别介绍如下。

一、不孕症的治疗

1. 临床资料:本组46例为本院中医科门诊于1981年2月~1985年2月间仅用中药治疗的不孕症患者,其中单侧或双侧输卵管炎症22例,慢性盆腔炎18例,不排卵1例,5例正常。年龄26~30岁者41例,31~37岁者5例;病程为1年半~10年,平均2.1年。对本组病例的男方作精液检查,均无异常。

2. 治疗方法与疗效:主方为少腹逐瘀汤,由小茴香6克、炮姜3克、川芎10克、元胡10克、肉桂3克、没药9克、赤芍10克、当归30克、生蒲黄12克和炒五灵脂9克组成。兼输卵管炎症者选加荔枝核12克、川楝子10克,公英24克,车前子12克,银花24克。每月月经来潮时服用,日1剂,一般每次服3~5剂,一个月经周期为一个疗程。疗效最好者服药1个疗程即受孕,最多服用4个疗程。结果服药1疗程受孕11例,其中婚后1年半未孕者10例,7年未孕1例;服药2疗程受孕6例,其中1年半未孕4例,2年未孕2例;服药3~4疗程受孕28例,其中1年半未孕6例,2年未孕20例,3年及4年未孕各1例。1例无效者为无排卵性不孕。

二、崩漏的治疗

1. 临床资料:本组20例为本院中医科门诊于1978年5月~1985年2月间用中药治疗的崩漏患者,其中功能性子宫出血者11例,人工流产后出血者3例,产后恶露不尽者4例,子宫肌瘤出血者2例。其中功能性子宫出血患者年龄11~39岁,出血持续时间40~90天;人工流产后出血者年龄33~35岁,出血持续时间15~30天;产后恶露不尽者年龄均为27岁,持续时间60~80天,平均67天;子宫肌瘤出血者37岁及42岁各1例,末次月经时间分别为30天和60天。

2. 治疗方法与疗效:主方由益母草30克、当归15克、黄柏15克、厚朴10克、槟榔10克、女贞子15克和银花30克组成。用药1~2剂后,无论血止否,只要小腹不胀不痛,无血块者一般不再用动血之品,应调补冲任,以治其本。治疗结果,功能性子宫出血患者,2例少女服药2次均无明显疗效;20岁1例服药2次好转;其余8例服药1次而愈者7例,服药2次而愈者1例。人工流产后出血者均服药1次而愈。产后恶露不尽者服药1次均痊愈。子宫肌瘤出血者均服药1次血止,后由妇产科行子宫全切术。

三、体会

祖国医学认为,冲为血海,任主胞胎,肾气旺盛,精血充足,任脉通,太冲脉盛,月事才能以时下。两精相搏,方能受孕。若肾虚、血虚、痰湿、肝郁、血滞等因素引起冲任失调,则不能摄精受孕,或出现月经不调。

用药物代替刮宫就是根据以上理论设计的,临床适用于不孕、崩漏、产后恶露不尽、宫缩无力或刮宫术后阴道出血淋漓不尽者。用

温经散寒法治疗四肢血管病的观察

广州市中医医院 潘建中

四肢血管病是指血栓闭塞性脉管炎、闭塞性动脉硬化、雷诺氏病、变应性结节性皮肤血管炎、深部血栓性静脉炎等。我根据“审因论治”、“异病同治”的原则,运用温经散寒法治疗上述5种病,取得较好的疗效。现举案例三则,谈谈我的体会。

病案举例

例一:梁××,男,43岁,船长,病历号253791。左手指溃疡肿痛一个多月,于1980年10月20日就诊。自诉1980年5月份左手感觉不适,8月病情加重,9月初左手食指远端肤色先紫暗,继则肿胀、溃疡、疼痛。溃疡面积1.2×1.3厘米,分泌物清稀,肉芽淡红,边缘分界不清,舌质淡红、苔白微黄,右手脉缓细、左手无脉。测皮温(室温28℃)示左手内关穴31.4℃,右手内关穴34.5℃;血流图示左手1~5指动脉搏动及波幅均消失,右手1~5指动脉搏动幅度正常。诊断为左上肢血栓闭塞性脉管炎(坏死期)。即予内服通脉方(附方₁)加银花叶20克、虎杖30克,日服1剂,共35剂。消炎洗方(附方₂)35包外洗。伤口外敷拔毒生肌膏(附方₄),日敷1次。肌注青霉素。复诊见食指肿胀消退,伤口愈合,疼痛减轻,五指转暖,肤色由紫暗转红润,口干苦,继服通脉方加银花叶20克,21剂,消炎洗方7包,活络洗方(附方₃)14包外洗。再诊见左手五

指疼痛消失,肤色红润,舌质淡红,苔薄白,左手脉濡缓,右手脉弦。左手挠、尺动脉搏动强而有力,测皮温(室温16℃)示左手内关穴28.6℃,右手内关穴29.5℃;血流图示左手各指基本正常。

按:血栓闭塞性脉管炎以及闭塞性动脉硬化、雷诺氏病等,与祖国医学的“脱疽”、“脱骨疽”记载相似,祖国医学对其症状和治疗已都作了较详细的论述。《灵枢·痈疽篇》指出:“夫血脉营卫,周流不休……寒邪客于经脉之中,则血泣,血泣则不通,不通则卫气归之,不得复发,故痈肿寒气化热,热胜则腐肉,肉腐则为脓,脓不泻则烂筋,筋烂则伤骨,骨伤则髓消……”气为血帅,气行则血行,气滞则血凝。血为质,气为能,血无气的推动,就不能周流。寒为阴邪,其性重着,收引凝涩,血遇寒则凝,感受寒邪,可引起或加重血脉瘀阻。形成上述三种病的内因为气虚无力推动血流畅运于脉道,导致血流缓慢或凝结。外因为寒邪侵袭经脉。寒邪侵袭脉外则脉寒,脉寒则血脉缩蜷,缩蜷则绌急,则血管痉挛,使局部缺血,形成缺血期,其症状为肢体麻木、发凉、苍白、紫绀、潮红;寒邪侵袭经脉之中,则引起血泣,血泣则不通,气血凝滞,脉道闭塞,使局部出现营养障碍,形成营养障碍期,其症状为发凉,皮肤干燥,痹痛,间歇性跛行。寒邪化热,热胜则肉腐,引起组织坏死,形成溃疡期

(接上页)

药原则是:先用1~2剂药物清热祛瘀、凉血止血、缩宫;血止后再调补冲任。服第一剂药时部分病例可出现一时性出血增多,瘀血排出之后,经络血脉即和,新血即可内守。同样刮

宫术后残留胎膜或感染引起的出血,亦可用此法。但未婚妇女一般不用此法。中药代替刮宫治疗的优点在于可减少病人手术痛苦,针对寒湿、瘀血、湿热等原因进行辨证论治,可改变宫内环境,使孕卵容易着床。