

血化瘀。此外,随症选用活血化瘀和解毒抗癌之品是必要的,如八月扎、元胡、郁金、丹参、龙葵、蛇莓、半枝莲、白英、白花蛇舌草等,这就是辨证与辨病相结合。肿块明显而体质较强,多加三棱、莪术,偏阴虚者则用鳖甲。痛甚则以川椒、细辛止痛,或选用敷贴止痛外用。有黄疸者常加茵陈、金钱草、虎杖等;有腹水者则伍用五苓散;有衄血、呕血者加茅根、仙鹤草、三七粉;有消化不良者加焦三仙等。肝肾两亏,重用枸杞子、女贞子。肝癌发热,辨明上中下三焦,分别用黄芩、黄连、黄柏,热甚者,可用白虎汤。

陈泽霖副教授(上海医科大学中山医院):肝癌证治的关键是早诊断,早治疗,不然预后堪虑。我经长期观察,发现肝癌早期病人有部分可在舌象上有所反映。1981年曾调查过112例肝癌患者,发现舌质青紫,舌边有瘀点、瘀斑者56人(占50%);舌脉增粗延长、色紫黑以及小静脉扩张者72人(占64.22%),为所有恶性肿瘤中比例最高者。因此,我在临床对见有舌边瘀点、瘀斑且呈条状,并有舌脉粗长者,即及早予以作甲胎蛋白测定、肝同位素扫描、B型超声波检查等,以明确诊断,及早转外科手术。这种病例虽然不多,但确有价值。

当归补血汤与三棱补血汤治疗白细胞减少症疗效的比较

湖南省衡阳县中医医院 蒋治平 刘忠兰

我们试用当归补血汤和三棱补血汤治疗不明原因的白细胞减少症患者各5例,并设立5例对照组。结果表明,三棱补血汤疗效较佳。现报道如下。

治疗对象

选取在两周内3次检查末梢血液白细胞计数均低于4000/立方毫米且发病原因不明的患者15例。症状有神疲乏力者10例,头昏者9例,低热者3例,易患感冒者5例,无明显临床表现者4例;男11例,女4例;年龄最大59岁,最小18岁。

治疗方法

将15例患者随机分为三组,每组5例。

1. 当归补血汤组处方:当归6克,黄芪30克,文火水煎,每日1剂,分两次服。

2. 三棱补血汤组处方:当归6克,黄芪30克,三棱10克,煎服方法同前方。

3. 对照组患者不服中药。

三组患者每人每日均予蜂乳胶囊6颗,多种维生素6片,分三次口服,均嘱注意休息。

疗效分析

从开始治疗日起,每周检查末梢血液白细胞计数1次,连续3次。计算各组治疗前后白细胞计数。经各组自身比较,经统计学处理,当归补血汤组有显著性差异($P < 0.05$);三棱补血汤组有极显著性差异

($P < 0.01$);对照组无显著性差异($P > 0.2$) (见附表)。治疗后白细胞均数差三组间比较,亦有显著差异($P < 0.05$)。

附表 分组治疗白细胞减少症疗效表

	治 疗 前	治 疗 后	治疗前后差值
当归补血汤组	3815.6 ± 353.5	4241.4 ± 333.7	925.8 ± 241.5*
三棱补血汤组	3164.8 ± 343.7	4742.6 ± 188.7	1523.8 ± 187.3**
对 照 组	3390 ± 326.3	3721.4 ± 402.3	331.4 ± 229.9

* 治疗前后自身比较 $P < 0.01$;

** 治疗前后自身比较 $P < 0.05$

讨论

白细胞减少症患者中医辨证多属气血两虚,治宜益气生血为主。当归补血汤由黄芪、当归二药组成。黄芪健脾益气,当归温营养血,两药配合,能使气旺血生。故当归补血汤能治疗白细胞减少症。三棱补血汤是于当归补血汤中加入三棱一药,三棱既可行气,又能祛瘀,因而能使补气而不滞,祛瘀而生新。故三棱补血汤疗效较前者为优。对照组病人不服中药,故疗效不佳。

通过临床观察,服用三棱补血汤无毒、副作用,并能迅速消除神疲、乏力等症状。