

固醇激素)治疗,副作用大,效果并不理想。我们通过多年临床实践,认为养阴合剂能够治疗强地松所造成的慢性肾炎阴虚状态,达到提高疗效的目的。养阴合剂由生地、知母、山药、鳖甲、玄参、黄柏、麦冬、石斛、山萸肉、白芍、茯苓组成。诸药合用,益肾养肝,滋阴潜阳,清心宁神。

沈英森(暨南大学医学院附属医院中医科),临床所见慢性肾炎属虚实错杂者多,故治疗上常采用攻补兼施、或标本同治、或补虚泻实、或阴阳兼顾等法。对一些病情较重、缠绵难愈者,我常用济生肾气丸(汤剂)加减配合银翘解毒丸进行治疗。如患者高×,男,21岁。于1970年患肾炎后,病情时轻时重,缠绵不愈,至1983年3月,自觉腰痛腰痠,颜面浮肿,神疲体倦,小便清长,又见咽痒咽痛,舌红苔薄根部黄,脉弦细略数,尿常规:蛋白

(++),红细胞10~20,白细胞2~6,颗粒管型0~1,细胞管型0~1,经服西药无效住院进行中医治疗。辨证属于脾肾两虚,外邪乘虚而入,采用温补脾肾与清热解毒,透达外邪之法治之,煎剂用济生肾气丸加减:熟附片10克,牛膝12克,车前子15克,生地15克,白术15克,茯苓10克,泽泻10克,丹皮10克,猪苓10克,怀山药24克,白茅根30克,蝉衣6克。咽喉炎症明显时加银花藤30克;腰痠明显时,加杜仲10克,桂枝3克。同时,早晚各服银翘解毒丸一丸。经过近3个月治疗,好转出院,出院后坚持3个月门诊治疗,临床症状消失,多次尿常规检查均阴性,随访2年多未见复发。该方具有补而不滞,利而不伐的作用。银翘解毒丸有清热解毒、宣肺达邪之功效。几年来,我用此法治疗多例慢性肾炎患者,均获较好疗效。

自制及莪散治疗血管瘤简介

安伯君*主治

周健**整理

血管瘤属于中医学的血瘤范畴,其病程较长,缠绵难愈。笔者运用“及莪散”治疗血管瘤17例,均获良效。今不揣谬误,介绍于后。

“及莪散”系我家传秘方,由白及、莪术、黄药子、山慈菇、重楼、紫硃砂、五倍子、月石、甘遂、青木香、雄黄、血竭组成。方中,白及、五倍子收敛止血;莪术、血竭活血逐瘀;黄药子凉血降火、消癭瘤;山慈菇、重楼、青木香、紫硃砂、雄黄、月石、甘遂为消癭散结、清热解毒之用。全方共奏活血逐瘀、清热解毒、凉血降火、收敛止血、软坚散结之功。血管瘤的病机正是心火妄动、热迫血行、血不循经、外溢肌肤、气血壅滞郁结而成,故用“及莪散”治之有效。

病例:吕某,女,1.5岁。患儿出生后三天,发现右耳下腮腺部位有颗粒红点数个,后红点逐渐增大,变为肿块突出于右侧耳下。遂往厦门、福州、上海、成都等地医院求治,确诊为“右侧淋巴管混合型血管瘤”,经中医、西医多方治疗,疗效不显。患儿右侧耳下肿块继续增大,如小皮球状,乃于1974年5月20日求诊。

面色萎黄,唇色淡,脉弱。查右侧耳下腮腺部位有一7.8×7.5厘米肿块,呈半球形,肿块色紫红,硬度中等,如海绵状,肿块表面有颗粒红疹,并见血丝缠绕。诊断:“血管瘤”。

治用“及莪散”:白及50克,莪术30克,黄药子20克,山慈菇10克,重楼5克,紫硃砂2克,五倍子5克,月石5克,青木香2克,雄黄5克,血竭3克。上药为末,合匀备用。用法:沸水适量,加入白酒10克,食醋5克,再合上药末为糊状,调敷患处。并嘱每日换药一次,7天为一疗程。

5月27日二诊:肿块已完全停止增长,颜色略见淡红,肿块表皮红色疹点和血丝已开始减少。续用“及莪散”调敷2周。

6月9日三诊:肿块已缩小至3×2.5厘米,表皮红疹和血丝已大为减少。续用“及莪散”调敷3周。

6月30日四诊:肿块已完全消失,表皮红疹和血丝已退净,患处皮肤色泽与健侧无异。续用“及莪散”调敷2周,以巩固疗效。随访十年,未见复发。

检查:患儿神清,体温、呼吸正常,身体消瘦,

* 四川省安岳县安农乡卫生院

** 四川省安岳县卫生局