

则人体消瘦,面色萎黄无华,手足不温,畏寒,舌有裂纹、尖稍红、苔薄,脉细弱。症属脾肾阳虚,阴亦不足。治以温补脾肾为主。药用:炮附子7克,桂枝7克,太子参15克,生黄芪30克,炒白术10克,台乌药10克,茯苓10克,黄连7克,升麻炭3克,杭白芍10克,枸杞子15克,生山楂15克,乌梅10克,儿茶15克,血余炭15克,焦神曲10克。上方加减服药月余,大便成形,每日1~2次,患者高兴返里。

造血功能障碍的治疗

火热毒邪深入,损伤肝肾,精髓亏虚,出现白细胞或血小板减少,并伴周身乏力,腰膝痠软,头晕,目眩,耳鸣,或心悸气短,或五心烦热等症状。段师多以脾胃为中心,全面兼顾,健脾益肾,益气育阴。对于轻度白细胞下降,全身反应不明显,脾胃尚健者,仅以黑木耳一味,洗净焙干研面,每日以15~30克分3~4次冲服。黑木耳入肾,具益气养血之功效,一部分患者服后白细胞上升至正常水平。

对于一般白细胞或血小板下降伴全身症状者,他常用经验方:生黄芪15~30克,太子参15~30克,白术10克,陈皮6~10克,半夏10克,山药10克,当归10克,枸杞子15克,女贞子15克,何首乌15克,黄精15克,

知母6克,鸡血藤15~30克,石韦30克,三七粉(分冲)3克,大枣5枚。若血小板降低,再加商陆15~30克,五味子10克。该方亦是常用于放、化疗之保护方剂,以预防副反应发生(若预防放疗副反应,则加入清热解毒药2~3味,如金银花、菊花、花粉)。他特别注意用三七,认为在益气养血药中加入三七行血,可促新血生长,提高疗效。

对于肝肾损伤严重,上二方不效者,段师认为精髓亏虚,非血肉有情之品填补不可,益其精者,补之以味。常以鹿茸、人参、三七、紫河车、阿胶共研细末和匀装胶囊,每日早晚各服1.5~3克。若脾胃功能差,再配以健脾开胃之汤剂,效果不错。如患者张某,1979年患恶性淋巴瘤,在某医院放疗一个疗程,放疗后又化疗两个疗程,出现造血功能障碍,白细胞持续在2500~3500/立方毫米之间,不能继续化疗。服前方无效,乃改服本方,服药两个月,白细胞升至4500~5000/立方毫米,化疗5周后,白细胞为3900/立方毫米,化疗结束一周后白细胞恢复正常,达4300/立方毫米。

段师认为,放疗、化疗引起的毒副反应,是一种特殊的临床表现,与常见的内科杂病有区别,治疗也不完全一致。主要是预防,如果放、化疗之时,配合服中药,毒副反应将大为减少或减轻。

验 方 消 瘀 膏 介 绍

湖北省恩施医学专科学校附属医院 赵敬华

消瘀膏是我校赵昌基副教授的伤科祖传外治验方,该方遣药精专,疗效肯定,现介绍如下。

药物组成与治法:大黄500克,白芷、姜黄、生乳没各150克。诸药共研细末,每100克药粉加凡士林50克,蜂蜜100~150克,先加热融化凡士林及蜂蜜,后加药粉调匀成膏,贮藏备用。冬季或陈旧性疾患用时加适量白酒,夏季加适量白醋,加热调匀使

用。

使用方法:视损伤部位大小,将药膏摊于棉垫之上,用绷带包扎。冬季48小时换药一次,夏季24小时换药一次,换药时须先洗净皮肤。

适应证:凡属跌打闪挫及其他原因所致局部血肿,四肢关节脱位复位后软组织肿胀及骨折后瘀血,均可使用。