

炎作用,然而却又能增强炎性细胞对异物的吞噬,提示银翘散对免疫系统功能的影响异于常用的甾体及非甾体抗炎药和抗过敏药(它们均于明显抗炎抗过敏的同时,抑制机体的抗感染免疫),这可认为是银翘散免疫药理作用的一个特点。

三、内毒素是感染性疾病临床上发热、白细胞改变等以至休克、DIC和死亡的主要致病因素。作为以急性热性感染为主要治疗用药之银翘散对内毒素的上述致病作用的影响亦应予以研讨,本文用内毒素腹腔注射于小鼠,以腹腔通透性增高、扭体反应及腹泻等指标来观察银翘散的作用,结果未能确定其效果,但银翘散有明显的解热作用,看来,其解热可能不是通过对内毒素的灭活解毒所致。

四、由本文对银翘散袋泡剂、片剂、煎剂的作用比较可以看出,以袋泡剂作用为强,特别是表现在解热、抗过敏及促进巨噬细胞吞噬方面。由化学研究得知,同量袋泡剂的挥发油成分较煎剂、片剂高2.1倍,

非挥发性成分也高得多,为煎剂的1.4倍。可见,袋泡剂是一种能体现方剂的全部特色的一种服用方便、疗效显著的新剂型。吴塘在《温病条辨》中述及本方时明确指出:“上药杵为散……鲜苇根汤煎,香气大出即取服,勿过煮。”此实为本方剂取得良好临床疗效的关键。本文袋泡剂所含成分及药理活性均高于煎剂、片剂,对中医上述经验是一个充分的证明。

参 考 文 献

- (1) 张静楷:中成药研究(9):22, 1981。
- (2) 邓文龙等:药学报15(10):590, 1980。
- (3) 朱秀媛:药学报14(11):685, 1979。
- (4) 少年红协作组药理小组:中华医学杂志57:81, 1977。
- (5) 熊用周等:动物学报22(2):187, 1976。
- (6) 邓文龙等:中草药12(10):26, 1981。
- (7) Stuart AE, et al: Hand-book of experimental immunology P 31.25, third-ed ed Weir DM, Blackwell, Oxford, London, 1978。

以中医药为主治疗淋巴结转移性低分化癌

沈炎南主治 杜同仿 蒋瑞峰 万祖萌 整理

沈老曾治疗淋巴结转移性低分化癌验案1例,现介绍如下。

黄×,男,50岁,工人,1984年3月8日初诊。

患者于1983年6月偶然发现右颈部有一肿物,经当地医院抗炎治疗无效,遂转至××医学院附属肿瘤医院诊治。查右颈部肿大淋巴结4个(最大者 3.5×4 厘米²)、质中等、可活动,鼻咽顶后壁稍增厚(为粘膜下肿瘤)、表面光滑、右隐窝变浅(1×1 厘米²);病理活检示肿物为淋巴结转移性低分化癌。诊断为右颈淋巴结转移癌、鼻咽癌。行放射疗法2月,复查见鼻咽部肿物已控制,右颈部尚存0.5厘米淋巴结1个。患者求服中药,遂请沈老诊治。

刻诊:患者倦怠乏力,咽痛口燥,纳呆恶心,声嘶便黑,咽部红肿,右颈微肿,皮色发红,舌淡红、苔灰黑焦干,脉弦细;右侧胸锁乳突肌上方可扪及一球形肿物(1×1.5 厘米²)、质稍硬、边缘清楚,可活动,无压痛。此乃失荣,治宜养阴散结、扶正散结。

处方:夏枯草、牡蛎各15克,天花粉、生地各12克,川贝、玄参、麦冬各9克,天龙2条(焙干研末冲服)。每日1剂,水煎服。

上方略有出入(花粉、生地加至15克,另加北沙参15克,白芍12克),共服82剂,患者精神转佳,胃纳复常,颈部肿块消失,皮色如常,除口微渴外,余无不适,舌淡红、苔黄白相兼略有黑苔,脉细。经肿瘤医院复查,鼻咽及颈部无异常,肿大淋巴结消失。为巩固疗效,嘱患者隔日服汤药1剂(北沙参、生地、夏枯草、牡蛎、天花粉各15克,玄参、麦冬、川贝各9克,白芍12克,甘草6克),另每日研末吞服天龙2条。随访至1984年7月底,患者生活正常。

按:失荣又作失营,多发于颈部或耳周,属岩的一种。本病多因情志郁结、痰火邪毒凝聚、内伤阴液所致,预后多不良。沈老治疗本例患者,方选消瘰丸合增液汤加减,药症相符,故连方80余剂即收显效,真可谓平淡之中见神奇。