

喉科肿瘤治验2例

甘肃中医学院 华良才

例一：柴××，男，26岁，工人。病历号30079。1978年9月4日初诊。自述4个月前发现咽部异物感，轻微疼痛，咽部右侧有一黄豆大小肿物。曾在某医院注射青霉素10天，效果不显，前来诊治。患者自觉肿物生长较快，咽痛，妨碍吞咽。检查：见右侧扁桃体连及舌根部有一蚕豆大小肿物，触之较硬，活动度差，后鼻镜及间接喉镜检查未发现异常。全身浅表淋巴结未触及。脉弦，舌苔薄黄，舌质暗红、有瘀斑。取肿物组织活检，病理报告为“扁桃体鳞状细胞癌”。中医辨证为血瘀痰凝。拟予活血化瘀，祛痰散结之法治之。处方：生蒲黄10克，五灵脂10克，土鳖虫10克，穿山甲15克，当归15克，制乳没各10克，全瓜蒌25克，川贝母10克，皂角刺10克，莪术10克，地龙10克。水煎服，每日一剂。另用山豆根120克，山慈菇120克，杏仁150克，急性子50克，孩儿茶150克，共为细末，炼蜜为丸，每丸重3克，含化，徐徐咽下，每日6粒。治疗35天，自觉咽痛已除。肿物略变软、变小，活动度增加，再予前方加血竭5克，夏枯草10克。含化药继用。又治疗35天，自觉咽部已无不适感。局部检查，肿物已消。又以含化药之半量为末，炼蜜为丸，如法使用一个月。1985年4月25日随访，未见复发。

例二：徐××，女，51岁，工人。病历号10019。1978年2月3日入院。患者6个月来自觉咽喉不适，有时疼痛，声音嘶哑日渐严重，近两个月来有时进食发呛。间接喉镜及直接喉镜检查，会厌喉面有肿物，菜花状、质硬而脆，触之易出血，因肿物较大，未能暴露声带。气管前淋巴结未见肿大，触及颈上深肿大淋巴结3枚，黄豆大小，活动度好，无粘连，无融合，中等硬度。病理检查为：“喉癌，混合型，I级鳞状上皮细胞癌”。患者营养较差，消瘦，

全身检查及胸部X线透视未见其他异常。患者不愿手术治疗，要求服中药。予以软坚散结之法。处方：夏枯草15克，山慈菇15克，七叶一枝花15克，威灵仙15克，猫爪草25克，鸡内金15克，生牡蛎30克，太子参15克，焦山查、神曲、麦芽各10克。米醋20毫升，分两次兑入药中，水煎，饭后服。并把药渣用纱布包裹温熨颈部肿大之淋巴结处。另以壁虎25条，蛤粉50克，粳米60克同炒至米焦黄，僵蚕15克，全蝎15克，蜈蚣10条，硼砂15克，露蜂房30克(烧存性)，共研为细末，装入胶囊，每服4粒，1日3次，温开水送服。治疗3个月后，咽痛不适大减，进食已不发呛，声音嘶哑明显好转，治疗120天，症状全消。间接喉镜及直接喉镜检查，喉部肿物已平，声带运动、闭合良好。颈上深肿大之淋巴结已消。嘱如法再服装胶囊之药物半剂，以巩固疗效。1985年4月29日随访，未见复发。

按：例一为喉癌早期，未发现淋巴结转移及颅内和重要器官的转移，正气尚存，故用活血化瘀、祛痰散结之药物，冀图肿物消散。在临床实践中，笔者体会，喉癌早期除辨证论治外，还可选用以下抗癌药物，如丹参、赤芍、三七、半夏、胆星、莱菔子、龙葵、石菖蒲、木鳖子、紫草、血竭等。例二肿物已明显增大，有颈部淋巴结的早期转移，但尚无颅内及其他重要器官的转移，正气未虚，故此时不宜用大量活血化瘀药物，以防止肿瘤的进一步扩散。本例使用软坚散结药物治疗满意。笔者对此类患者还常选用下列抗癌药物，如昆布、海藻、硼砂(研末装胶囊)、射干、白矾、核桃枝等。在选择药物时宜扬长避短，选择具有多功能的药物。肿瘤早期，如患者大便干可选用瓜蒌、杏仁、当归等药，这些药兼有润肠通便作用，若便溏则可选用半夏、薏米等健脾化湿药。