

治愈天数 76.5 天。本组疗效与文献报道乙双吗啉治疗银屑病的疗效基本相同⁽²⁾。

复方消银汤组和乙双吗啉组经统计学处理差别不显著 ($\chi^2=1.65$ $P>0.05$)。两组进行期疗效均比静止期好,病期短者均比病期长者疗效好。

复方消银汤组 84 例均未见副反应。乙双吗啉组 44 例中,5 例发生副反应(占 13.6%),主要为白细胞数降低到 4000/毫米³以下,这些患者未给予任何升白细胞药物,在停药 2 周左右,白细胞数均能回升。两组患者治疗前后肝功能均未见异常,无明显消化道症状,这可能与饭后服药等因素有关。

随访观察:对临床痊愈的患者于治疗后每 2 个月随访一次。复方消银汤组获随访者 40 例,3 例于治疗后 40~180 天复发,平均缓解期 85 天,复发率为 7.5%。乙双吗啉组获随访者 29 例,于治疗后 20~95 天复发者 18 例,平均缓解期 65 天,复发率 62%。复方消银汤复发率较乙双吗啉组复发率低,经统计学处理,差别非常显著 ($\chi^2=21.14$, $P<0.001$)。

参 考 文 献

- (1) 邵长庚:银屑病临床试验设计中的问题。中华皮肤科杂志 17(2):140~143, 1984。
- (2) 张裕坤:乙双吗啉(AT-1727)治疗寻常型银屑病 60 例的远期临床观察分析报告。临床皮肤科杂志 13(1)增刊:17~18, 1984。

中 医 药 治 愈 顽 固 骨 槽 风 1 例

河南中医学院方剂教研室 崔河泉

孙××,男,64岁,农民。1984年3月24日初诊。

患者左侧面颊部肿硬溃破、流清稀白色脓液一年余,经用西药八个月鲜效而来求治。察其体质虚衰,面部浮胖,色萎黄,舌淡苔白,脉沉而细。局部因长期溃疡,肉腐脓漏,致使患侧面颊部肌肉萎缩畸形,面庞双侧失于对称。以指按捏,约2厘米长、0.7厘米宽结节,其疮口以探针试之,深部有一位置与颊肌平行的瘻管,约1.5厘米深。流脓后疮口发痒。近两个月来,饮食日减,神疲乏力,头目晕眩,足跗微肿,自以为不可救药。追问病史,1982年12月发现左侧口腔内壁有一结节,有刺,状如海参。三个月后,面颊部疼痛,经用膏药敷贴治愈。一月后,因劳累复发,延至今日,病愈深重。遂嘱其以鲜蜗牛2枚,鲜野菊花嫩苗20~30茎,为一次量,放青石板上共捣为泥外敷,稍干即换。内服处方:麻黄10克,白芥子(炒)12克,熟地20克,鹿角胶(烊冲)12克,炮姜12克,肉桂15克,当归20克,黄芪30克,白头翁20克,苦参15克,蜂房10克,炙甘草15克。三剂。

4月28日二诊:经用土药两日,外敷五次后,瘻管脱落,疮口收敛,不流脓水。饮食略增,精神转佳,

效不更张,守前方继进六剂,外敷药照用。

5月10日三诊:疮口愈合良好,局部不肿不痛,停服煎剂及外用药,改为散剂内服。处方:熟地18克,鹿角胶10克,炮姜10克,肉桂12克,麻黄10克,白芥子(炒)10克,白芍12克,党参12克,黄芪18克,当归15克,元参15克,川贝10克,生牡蛎20克,地鳖虫12克,大黄12克,桔梗12克,甘草10克。五剂,共研细末,一日两次,一次6~10克,温开水冲服,以善其后。

一年后随访,未再复发,身体健壮,能从事劳动,唯局部留一深陷疤痕而已。

按:本证属外科顽证之一,《医宗金鉴·外科心法要诀》骨槽风条下曰:“此证一名牙叉发,一名穿腮发,证属在筋骨阴分,故初起肿硬难消,溃后疮口难合,多致不敛。口内腐烂,甚则穿腮落齿者,俱为逆证,当腐烂之初,治法即同牙疳,亦不过稍尽人事耳。”足见其难治如此。本病例外以鲜蜗牛、野菊花解毒消肿;内以当归补血托里扶正;阳和汤和阳通津,搜剔痰湿;白头翁、苦参、蜂房解毒散结,内服外治结合,而愈沉痾。