

织攻关小组, 尽快找出高效、速效、长效的理想药物。对重复性高、疗效较肯定的方药进行药理、药化等研究。

“一万年太久, 只争朝夕”, 在已有的实践基础上, 只要我中医药界有志之士, 立足攻关, 在防治尿毒症这一难关上, 可望获得某些突破性的进展。

参 考 文 献

- (1) 时振声: 中医杂志(4):75, 1983。
- (2) 中华内科杂志编委会: 中华内科杂志(6):358, 1981。
- (3) 赵淑颖: 中西医结合杂志(2):89, 1983。
- (4) 张镜人: 上海中医药杂志(2):11, 1982。
- (5) 张 琪: 黑龙江中医杂志(2):16, 1982。
- (6) 施边镇: 山西医药杂志(6):35, 1982。
- (7) 成都第一工人医院: 四川中医(1):61, 1983。
- (8) 陈以平: 上海中医药杂志(2):11, 1984。
- (9) 徐志英: 浙江中医学院学报(1):24, 1984。
- (10) 方冬莲: 湖北中医杂志(3):41, 1980。
- (11) 张庆怡等: 江苏中医杂志(3):30, 1980。
- (12) 吕敬江: 浙江中医杂志(4):163, 1981。
- (13) 刘 悦等: 陕西中医(1):11, 1983。
- (14) 王万林: 山西医药杂志(2):79, 1983。
- (15) 王克建: 中医杂志(9):33, 1984。
- (16) 哈医大一附院: 浙江中医杂志(5):212, 1982。
- (17) 史锦生: 浙江中医杂志(1):163, 1980。

- (18) 孙 怡等: 中西医结合杂志(2):86, 1981。
- (19) 项景明: 新中医(4):18, 1982。
- (20) 刘淑林: 陕西中医(1):8, 1983。
- (21) 杨世兴: 河北中医杂志(3):19, 1984。
- (22) 张秀仁: 浙江中医杂志(10):477, 1984。
- (23) 钱广平: 中医杂志(11):8, 1980。
- (24) 吴光华: 辽宁中医杂志(11):封四, 1982。
- (25) 广州中医学院附院: 新中医(增刊):27, 1980。
- (26) 顾文华: 上海中医药杂志(7):24, 1981。
- (27) 毕增祺: 中医杂志(9):21, 1981。
- (28) 浙江中医学院: 上海中医药杂志(10):42, 1981。
- (29) 胡龙才: 浙江中医杂志(4):169, 1981。
- (30) 忻德宇: 浙江中医杂志(4):162, 1980。
- (31) 余志鼎: 上海中医药杂志(4):42, 1981。
- (32) 付灿冰: 四川中医(创刊号):13, 1982。
- (33) 季长华: 辽宁中医杂志(2):22, 1982。
- (34) 黄发荣: 浙江中医杂志(3):16, 1982。
- (35) 岳秀艳: 吉林中医药(1):20, 1983。
- (36) 时振声: 中西医结合杂志(2):86, 1983。
- (37) 陈沛坚等: 新中医(1):20, 1983。
- (38) 李学铭: 浙江中医杂志(11):488, 1983。
- (39) 谭福天: 吉林中医药(6):23, 1984。
- (40) 郑平东等: 上海中医药杂志(11):45, 1984。
- (41) 陈琼华等: 新医药学杂志(5):34, 1974。
- (42) 刘祖慰: 辽宁中医杂志(5):28, 1985。
- (43) 张镜人: 上海中医药杂志(1):17, 1981。
- (44) 鲍 军: 浙江医科大学学报(3):137, 1980。
- (45) 郑际青等: 江苏中医(1):7, 1964。

脚汗草治疗特发性血小板减少性紫癜 5 例

甘肃省庆阳地区中医医院 王军仓 刘一民 雷玉珍
甘肃省庆阳地区人民医院 肖富荣

脚汗草(又名墓头回) 治疗特发性血小板减少性紫癜已有报道(《中医杂志》1983年12期), 兹介绍近期5例疗效如下:

一、一般资料: 5例均有典型临床症状, 并经治前骨穿确诊。年龄4~35岁, 其中14岁以下3例, 28岁1例, 35岁1例; 病程1年以内3例, 2年以内2例; 急性型4例, 慢性型1例; 门诊治疗1例, 住院治疗4例。

二、治疗方法: 根据年龄、体质, 每剂用鲜净全草100~250克或干品10~25克, 每日一剂, 水煎服。有效者服3个月, 疗效不佳者, 结合中医辨证配方施治。

三、治疗结果: 临床症状消失, 外周血象复常, 血小板回升至10万/毫米³以上, 判为显效者3例; 临床症状消失, 血小板回升至8万/毫米³左右, 但仍偶

有鼻衄需投药治疗, 判为好转者1例; 1例服药后临床症状无明显改善, 血小板较前无回升判为无效。5例中疗程最长者80天, 短者34天, 平均53.8天。其中2例用鲜净全草水煎频服, 连服3月, 症状消失, 血小板回升; 2例用干品全草, 连服7~15天, 出血好转, 继经辨证配方医治获效; 1例服大剂量干品1月无效, 改为西药治疗好转。

四、体会: 《中药大辞典》介绍本品用根, 干品入药最佳。我们观察治疗本病以鲜品全草疗效较好, 干品较差。另外有人用此药针剂对小白鼠进行实验, 在给药期间发现血小板有下降趋势, 停药后恢复(《中西医结合杂志》, 1983年第9期), 我们遇到一例成人患者用大剂量干品, 反而血小板下降。是否本药干品效果欠佳, 或系对成人患者疗效不著, 尚待进一步观