

⑧ 藟本——藟本<养>39。按：藟即苈字，<说文>谓藟属，<本草拾遗>作藟蒿，又名莪蒿、播娘蒿。⑨ 郁金——郁<五>208。按：系<唐本草>郁金略称。⑩ 白茅——茅<养>88。按：茅即<本经>白茅之略称。⑪ 射干——諝(射)干<养·残>。按：<本经>有射干。

(3) 谷类药——有 18 种

① 麦——麦<五>183。按：<别录>有小麦、大麦、穠麦三种。② 麦藁——麦藁<养>72。<说文>：“麦藁屑也”，即带麸之面粉。③ 稻——稻<养>75；稻米<养>4。按：<别录>名稻米。④ 稷——稷<五>119。按：<别录>名稷米。⑤ 黍——黍<五>49、119，<养>75；黍米<养>4；美黍米<五>150；陈黍<五>203。按：<别录>名黍米。⑥ 秣米——秣米<五>188，<养>2。按：<别录>名秣米。⑦ 粱米——粱米<五>186、190。按：<别录>名粱米。⑧ 青粱米——青粱米<五>56。按：<别录>名青粱米。⑨ 赤小豆——赤荅<五>2。按：赤荅即<本经>赤小豆别名。⑩ 大豆——叔(菽)<五>39、49、174、203、289；大叔(菽)<五>172；良叔(菽)<五>91。按：菽，<别录>名生大豆。⑪ 大豆根——叔(菽)本<五>213。⑫ 黑豆——黑叔(菽)<五>101、157。⑬ 蜀菽——蜀叔(菽)<五>221。⑭ 甘蔗——蔗<五>221。

按：<别录>名甘蔗。⑮ 藿——藿(藿)<五>117。按：原作陈藿。⑯ 五谷——五谷<五>57。⑰ 谷汁——谷汁<五>231。⑱ 米——米<五>111、163、248。按：米有多种，此处不详何指。

(4) 菜类药——有 10 种

① 藟——藟<五>22、43、112，<养>10；藟<五>278。按：<本经>名藟。② 葱——葱<五>279；乾葱<五>94。按：<本经>名葱实。③ 芥——薺<五>52；芥衷夹(中英)<五>123；界<养>50。按：<别录>名芥。④ 署瓜——著(署)藟(瓜)<五>153。⑤ 苦瓠——苦瓠<五>223；苦瓠<养>31。按：<本经>名苦瓠。⑥ 韭——韭<十问>。按：<别录>名韭。⑦ 荠实——荠孰(熟)干实<五>17。按：<别录>有荠。⑧ 菱芰——陵枝<五>222、224、259、266；陵枝(菱)<杂>34。按：陵枝即菱芰，即<别录>菱实，俗名菱角。⑨ 薑——薑<杂>6、11；薑<五>1、164、167；薑<五>179；乾薑<五>153；枯薑<五>239；乾薑(薑)<养>22、24、62、73；恒(薑)<养>63；乾薑<杂>10；薑<杂>12。按：<本经>名乾薑，<别录>有生薑。⑩ 兔头肉——兔头肉<五>57。按：据<尔雅>此为瓜类植物。

(待续)

中药治疗甲亢术后低钙性抽搐介绍

湖南省新邵县迎光乡卫生院 彭正清

我院曾遇 3 例原发性甲亢行双侧甲状腺次全切术后低钙性抽搐的患者，采用中药治疗，全部治愈。报告如下：

一、方药组成：黄芪 30 克，党参、阿胶、凤凰壳、龟胶、鳖甲、天麻各 12 克，当归、熟地、白芍、川芎、钩藤、炙甘草各 10 克。水煎服，每日一剂。

二、病例举例：马××，女，57 岁，住院号 1547。于 1980 年 7 月 1 日手术，术后 24 小时感手足麻木，47 小时出现发作性抽搐，每次 5~10 分钟，每日 4~8 次。伏斯特德鲁梭氏征均阳性，腱反射亢进。患者血钙 6.2 毫克%，血磷 7.2 毫克%（术前血钙为 10 毫克%，血磷 0.9 毫克%）。抽搐时静注 10% 氯化钙 10~20 毫升，能暂时缓解，停止注钙，下次抽搐加重，并口服乳酸钙片 1.6 克/日，维生素 D 10 万单位/日，至

第 11 日无好转，抽搐加重，伴呼吸困难。第 12 日加服中药。服上方 1 剂，抽搐缓解，即停用钙剂、维生素 D，3 剂后停止抽搐，15 剂后麻木感消失，查血钙 9.5 毫克%，血磷 5.3 毫克%。随访 4 年，未复发。

三、辨证与方解：低钙性抽搐多为阴血耗损，肝血虚衰，血不养筋所致的筋脉拘挛，手足震颤，肢体麻木，抽搐等症，属肝风内动。方中熟地，阿胶滋阴补血，当归补血活血，以白芍养血柔肝，鳖甲滋阴潜阳，龟胶补肾健筋骨，黄芪，党参补益气血，生津，养筋脉，以钩藤，天麻，凤凰壳止肝风内动之痉挛，镇静安神，川芎行气活血，助天麻散肝经之风，炙甘草通血脉，利血气，调和诸药。本方以四物汤，三甲复脉汤加减而成。具滋阴潜阳，育阴熄风，养血舒筋之功，从而达到熄风止痉的目的。