

对蜘蛛散中蜘蛛的研究

王聘贤*原著 周洪进**整理

《金匱要略》曰：“阴狐疝气者，偏有大小，时时上下，蜘蛛散主之。”对此，后世医家，凡有识者无不称效。如金元刘河间经数十年的临床实践，在其验案中就多处赞谓：蜘蛛散为“疔疝特效方”；《国医月刊》中，某君在多方研究的基础上，亦强调指出，蜘蛛散治疗狐疝“妙不可言”。然，就其方中蜘蛛而言，后世误用者甚多，如有人误作房边屋角之张网蜘蛛，有人误作草本败酱科之蜘蛛香等等。由此，严重影响其功力和作用，以致随年代迁延，采用之士渐少，使治疝良药被弃，殊堪研究。

吾于中年之期，偶闻友人某君，言其经商于粤时患疝气。先请中西医治疗，卒无寸效。后经一乡间农民介绍，以单味“袋蜘蛛”治之，数服即愈。由此，本人钻研不息，探索不止，遍访名师，多方考察，并经上百例的临床验证。从而终以认为：袋蜘蛛一物，疔疝功专，效力宏伟，当为《金匱》蜘蛛散之蜘蛛正品，特报告如下：

一、品名：

袋蜘蛛（又名口袋虫、壁口袋、土口袋）。

二、形态：

酷似张网蜘蛛，呈黑褐色而有光，大如豌豆。足共十只，左右各五，身长；头如蟹，夹曲如钩，长约3毫米，较身尤黑；尻腹尖圆而大，胸腹左右各有一白小点，内富清黄色；尾有两须，形尖，长约3毫米。

三、特征：

作网如口袋，并居其中，网呈灰白色，或灰黑色，长者65~100厘米，短者6~10厘米不等，直如竹筒，底稍尖，袋坚韧厚密如白夹皮纸。在外布网如喇叭，蝇虫过则辄出捕食。其跳跃甚速，捕捉时若不将口袋收紧，跳出即不可获。此物味香无毒，画眉鸟甚喜食之。

四、产地：

无论沙土、黄土，壁间屋角，棘丛园边皆产。《本草纲目》所载“土蜘蛛”，系生於草间，色花白有毒，非此物也，幸勿误会以害人，慎之慎之。

五、性味：

性微温，味辛香，无明显副作用。

六、功用：

无论疝气偏左偏右，肿大疼痛，或大如碗，或大如杯，或上拘而痛，或下坠而痛，或木硬不痛，皆有效验。

七、采集：

夏秋捕获。

八、制法：

于瓦器或铜器上微火焙至干脆，以气香色黄为度（不可煨，煨则功力减）；研为细末，或制成片剂、丸剂、胶囊剂等，亦可如法制成《金匱》蜘蛛散。

九、用法：

日服二至三次，每次三克，盐汤下（重症用烧酒下）。

十、反应：

药后睾丸可有短暂气窜感，或觉疼痛加剧，或见轻度恶心、呕吐，自可消失，勿需顾虑。阴囊木硬不知痛痒者，服后即觉疼痛，继之渐软渐消，多服数次自愈。

十一、案例：

1. 刘某，49岁，商人。患疝10年，屡治不愈，兼感少腹冷痛，时重时轻，甚或冷气上贯于齿，痛连两胁。诊见右侧阴囊肿大如杯，紧若绳缠，舌质晦暗，苔少，脉沉弦。乃属肝经寒闭之证。故以“袋蜘蛛”散投治。用药一

* 原贵州省中医研究所所长

** 贵州省武警总队医院

日，其痛若失；又服二日，疔消七、八；再予三日量，顽疾告愈，后未再发。

2. 刘某，39岁，工人。自幼患疔，诸方未效。兼患囊痈，经西医手术而愈，但每因疔疔必发，是故不敢妄治，渐成形容枯黄，体质衰薄，不堪其苦。诊见左侧阴囊大如拳头，胀痛俱有，舌质淡，苔薄腻，脉沉弦。以“袋蜘蛛”散治之。初服即感阴囊气窜，痛不可忍，且有轻度头昏眼花，恶心欲吐，片刻自消。因衰弱之体，不敢纵用，令日服二次。结果，叠进四日，遂获全功。再以十全大补善后，数年未发。

3. 宋某，46岁，农民。左侧阴囊硬大如鹅卵，劳动即疼，不劳则木硬不知痛痒。余先以张网蜘蛛（大如蚕豆，头小尻大，腹中有黄水者）熬焦合肉桂以投，其人连服一周，睾丸稍软，但大小未变。后改用“袋蜘蛛”散治之，

三服，睾丸小如核桃；五服，遂获全功。

4. 孙某，45岁，农民。因远途跋涉，屡遭淋雨，致疔日久。其右睾硬痛，行步艰难，痛苦难忍。余先以败酱科植物蜘蛛香与肉桂研末，令以酒吞服，投药四天，疔效不显，后以“袋蜘蛛”散令服，三次痛止，七次痊愈。

总而言之，余以为“袋蜘蛛”一物，乃治疔良药，系《金匱》蜘蛛散之蜘蛛正品。至于房边屋角之张网蜘蛛，虽与“袋蜘蛛”颇似，且属同类、同性，但治疔之功则逊也，而败酱科植物之蜘蛛香，气香性辛燥，以其辛通之力治寒疔，或亦有效，但多不稳定，且软坚散结之力甚薄，故均不能混而代之。对此，望诸同道，如法以试，多加研究。若能广识真伪，得以定论，使数千年失传之良方复显于世，让缠绵难治之疔疾药到病除，诚万民之福音也。

松乳膏治疗痈疔疔疽 200 例临床观察

沈阳铁路局吉林中心医院 谭宏儒

1977年11月~1981年9月我们以外贴松乳膏为主，治疗200例痈疔疔疽患者，效果较为满意，现报告如下。

临床资料：本组200例，男132例，女68例。年龄最小7岁，最大62岁。病程最长超过1个月，最短为3天，多数4~10天。

药物制备和用法：松乳膏由松香、乳没、樟丹、血竭、铜绿、轻粉、冰片、麝香等制成。先将松香打碎，然后将乳没、樟丹、血竭、铜绿、轻粉研成末，放入盆内，隔火烱炖，待溶化后放入冰片、麝香及适量蓖麻油，搅拌均匀即成。将膏药摊于纸上，敷贴患处。初起阶段，外用松乳膏可促进多数疮疡消散未溃而愈，取其散瘀消肿之功。脓成阶段，局部肿势高突，根盘形成，疼痛加剧，重症可伴发热恶寒等症状，外用松乳膏可促其溃破，取其托毒外出之功。溃后腐肉未脱，排脓不畅或形成窦道，可分别配合使用九一丹、七三丹、五五丹等外用膏，外敷松乳膏，并适当配合中药内服，取其活血散瘀、托毒生肌、消肿止痛之功。在使用松乳膏过程中，如个别患者疮口周围皮肤出现皮疹、瘙痒，应停药一、二天，待皮疹消退后可再继续

续使用。

治疗结果：本组200例，疮疡未溃而愈者72例，占36%，平均治疗6.9天；溃后而愈者128例，占64%，平均治疗16.3天。

典型病例：曾××，男，54岁，1977年11月15日初诊。患者2星期前颈后生米粒大小脓头，伴瘙痒，逐渐红肿热痛，伴头痛项强，发热恶寒。曾口服抗菌素及外用药，病情未能控制，肿痛增剧，痛如鸡啄，难以入睡。诊见颈部（风府穴两侧）红肿高突，两侧疮疡连为一体，面积约9×10厘米，两侧中心按之软，微应指，舌质红、苔黄，脉数，体温38.9℃。化验室检查：血白细胞22500/立方毫米，分叶75%，淋巴细胞25%。患者病情处于成脓阶段，法当散肿溃坚，透托解毒。外用松乳膏配合仙方治命饮加减三剂，颈痛破溃，热退，局部疼痛明显减轻，有少量脓血性分泌物，腐肉未脱，排脓不畅，疮面周围仍红肿。疮口掺九一丹，外敷松乳膏，内服透脓散合五味消毒饮加减。服上方7剂，周围红肿消失，疮面底部已长出新鲜肉芽，继以补气养血生肌之剂善后，同年12月16日疮面愈合。多次随访，未见复发。