

克,煎服或切片口含,疗效明显;若倦怠乏力、心悸少眠者,配白术、茯苓、当归、熟地、黄芪、肉桂、五味子、麦冬、远志、陈皮;若见有肝脾瘀血肿大者,辅以桃仁、红花、赤芍等活血化瘀之品,并具有推动人参益气养血之功;对肝病引起或有湿滞者,可选柴胡、陈皮、枳壳、苍术、厚朴。只要辨证明确,用药精当,常能收到较好的疗效。

吕志连(浙江省中医药研究所):引起白细胞减少症的原因有多种,根据其面眺少华、倦怠乏力、头晕耳鸣、心悸少眠或嗜睡、胃纳减少、怕冷腰痠等症状表现,多为脾肾两虚,属虚劳范畴。初起症状轻者,多以脾虚为主,或夹湿滞;日久失治或误治,则为脾肾两虚。治疗时我多以温补脾肾为原则,忌用苦寒、滋腻之品,常用黄芪30克,党参20克,当归10

克,炒白术10克,鸡血藤30克,仙灵脾10克,鹿角片10克,阿胶10克,赤小豆30克,红枣15克。若兼有脾阳虚者加桂枝、干姜;脘闷喜暖加良姜、香附;苔腻口淡加生苡仁、藿香;偏于肾虚者,加山萸肉、菟丝子、紫河车,或全鹿丸。本病不论新久,均可配用鹿茸片0.2克研粉吞服,日1次;或用鹿茸精针剂肌肉注射,日1支。坚持治疗,多能在二三周内白细胞逐渐上升,且疗效较稳定。

若因肿瘤化疗、放疗后引起的白细胞减少症,多有头晕乏力、低热口干、心烦少寐等气阴两虚之症,不可温补,只宜甘寒,应在清彻余毒的处方中兼以补气养阴,可选用黄芪、党参、当归、生白芍、麦冬、元参、生地、黄精、甘菊花、石斛、白花蛇舌草等;并另以西洋参3克,每日兑服,或切片口含,收效明显。

通经下乳汤治疗女性不孕2例介绍

黑龙江中医学院 谢彦整理

通经下乳汤系韩百灵老中医自拟方,对肝郁气滞、胞脉受阻所致女性不孕,疗效较好,兹介绍如下。

药物组成:当归15克,白芍25克,怀牛膝20克,王不留行20克,通草15克,瓜蒌15克,枳壳15克,川楝子15克,青皮10克,皂角刺5克,甘草5克组成。隔日服一剂,以经期服药为主,每日一剂。早晚各服一次,黄酒送服。

药物加减:兼肾虚者,酌加川断、桑寄生、杜仲、熟地、山萸肉等;兼血瘀者,酌加桃仁、红花、姜黄等;兼肝郁化热者,酌加生地、丹皮、知母等;兼肝脾不和者,本方可与丹栀逍遥散合用。

病例一:朱××,29岁,1980年9月初诊。婚后3年不孕。月经后期,经量少,经前乳胀,素善太息,少腹坠胀,胸胁胀闷,心烦呃逆,手足灼热,经期尤甚,经后诸证皆减。舌红少苔,脉弦滑有力。就诊前两个月曾作子宫输卵管碘油造影。基础体温测定3个月,均呈双相曲线。西医诊断:原发性不孕症,输卵管不完全性阻塞。中医辨证:属肝郁气滞,郁久化热,胞脉受阻所致之不孕症。治以调经通络,佐以清热凉血。处方:白芍40克,怀牛膝、通草各20克,当归、生地、王不留行、竹茹、川楝子、丹

皮、山栀各15克,生甘草、皂角刺各5克。服药三剂后,心烦乳胀大减,呃逆消失。上方去竹茹、丹皮、山栀,加枳实15克,隔日服一剂。连服一月余后,来信告之已怀孕,经随访知其娩一男婴。

病例二:坂本××,40岁,1976年6月初诊。婚后10余年未孕。形体消瘦,性情急躁,无故易怒,胸胁胀满,手足心热,胃纳不佳,尿亦便秘,经期乳胀,经量少,紫暗有块,小腹坠胀,经后则减。舌红苔微黄,脉弦涩。证属肝气郁滞,脉络不畅,冲任不调,胞脉受阻,故不能摄精成孕。处方:当归、赤芍、川牛膝、王不留行、川楝子、通草、瓜蒌、丹参、香附各15克,川芎10克,皂角刺、生甘草各5克。隔日一剂。三剂后脉证如前,但觉食欲不振,身体倦怠,此为肝气乘脾,脾失健运之故,上方加白术、山药各15克。又三剂,改每日一剂,早晚各服一次。服药后正值经期,乳胀、胸闷及小腹疼痛均减轻,食欲好转,但腰痠痛,原方去皂刺、瓜蒌,加川断、桑寄生各15克,以调肝补肾,嘱其隔日一剂,连续服药三个月。药后诸证皆减,乃改每值经期服药,每日一剂。1977年春回日本,翌年春从日本来信说:“归国后不久即孕,生一女婴。”