

人报道用升麻葛根汤治肝炎疗效甚佳(陈立华: 辽宁中医杂志(8):8, 1983); 中国中医研究院西苑医院方药中教授也将升麻用于治疗肝炎而取得较好的疗效。我县民间有用升麻浓煎湿敷治疗带状疱疹, 疗效很好。笔者多年来也试用升麻治疗流感、麻疹、流行性腮腺炎等, 疗效确实很好。如治麻疹, 我认为不论何期, 只要热毒壅盛, 即可放胆使用, 曾治疗几十例, 可缩短疗程, 减少并发症。治流感和腮腺炎, 在对症方药中加用升麻常可使疗效明显增加。

总之, 升麻的解毒作用应引起重视。至于升麻的用法, 据有关文献记载, 大量使用易致中毒而出现头痛、震颤、四肢拘挛等症, 故大剂量使用宜慎重。笔者在临床用于清热解毒、发表透疹, 一般以 10~30 克为宜, 且宜生用, 配伍生甘草, 更能增强其清热解毒、发表透疹之功而避免其毒副作用, 有一举两得之妙。如用于升阳举陷, 则升麻用量宜小, 以 5~10 克为宜, 且以蜜炙为宜。

江西省乐安县招携采育林场职工医院 乐绍宗

介绍二则用药配伍

一、羚羊角配肉桂

羚羊角为平肝熄风、清热镇惊的要药, 性味咸寒, 入肝、心二经。明代医家李时珍说: “羚羊角入厥阴肝经甚捷。肝主木, 开窍于目, 其发病也, 小儿惊痫, 妇人子痫, 大人中风搐搦, 及筋脉挛急, 历节掣痛, 而羚羊角能舒之。……相火寄于肝胆, 其气为怒, 病则烦懣气逆, 噎塞不通, 寒热及伤寒伏热, 而羚羊角能降之。”肉桂甘辛大热, 入肝、肾二经。张石顽说: “肉桂气味俱厚, 益火消阴, 大补阳气, 下焦火不足者宜之。”《本草汇》谓肉桂能“散寒邪而利气, 下行而补肾, 能导火归原以通其气……能走能守之剂也。”两药一寒一热, 一清一温, 本人宗交泰丸交通心肾的理法, 用羚羊角配肉桂以治肝阳偏亢, 头眩面红, 肾阳虚衰, 四肢不温的高血压症, 使其阴从阳化, 水火交泰。应用羚羊角以平上亢之肝阳, 赖肉桂引火以归原, 从而达到改善机体功能, 调整阴阳偏胜的作用。

二、牛角腮配绿萼梅

牛角腮性味苦温, 入心肝二经, 《本经》说它能“下闭血, 瘀血疼痛”, 此言其有活血化瘀之功; 又治“女人带下血”, 此谓其有止血之用。《本草经疏》亦云: “牛角腮乃角中嫩骨也。苦能泄, 温能通行, 故主妇人带下及闭血、瘀血疼痛也。”阐述了牛角腮的功效既能化瘀, 又能止血。笔者用其取活血化瘀之功。绿萼梅为蔷薇科落叶乔木梅的花蕾, 性味酸涩而平, 入

肝、胃二经, 功善疏肝散郁, 开胃生津, 适用于肝胃不和, 胸膈满闷, 嘈杂泛恶, 以及痰气交阻的梅核气等症。牛角腮入血分而绿萼梅入气分, 两药合用, 有调畅气血之功。笔者在治梅核气患者时, 常在辨证方药中加此两味, 确有疗效。

上海中医学院 陈学勤

射干治疗乳糜尿临床验证

《射干治疗乳糜尿 104 例》在你刊 1981 年第 5 期刊出后, 引起我们的重视。我地亦系斑氏丝虫病高发地区, 乳糜尿患者临床较多见, 虽经多年观察摸索, 疗效仍不够理想。1983 年 4 月, 我们开始用射干治疗乳糜尿, 经 3 年的临床验证, 确有较好疗效。现将 1983 年度所治的 87 例小结如下。

临床资料: 87 例中, 男性 57 例, 女性 30 例; 年龄最大者 71 岁, 最小者 17 岁; 病程最长者 17 年, 最短者 2 个月。大多呈间歇性发作。

治疗方法: 病程长及体质壮实者, 用射干 20~25 克, 病程短及体弱者用 12~15 克, 煎水适量, 一日分 3 次服。病程长者, 酌加川芎 9 克, 赤芍 12 克; 乳糜血尿者, 酌加生地 15 克, 仙鹤草 15 克。

治疗结果: 87 例中临床治愈 74 例, 占 85.1%。门诊随访: 3 年未复发者 41 例, 占 47.1%; 2 年内复发者 11 例, 占 12.6%; 3 月~1 年内复发者 22 例, 占 25.3%。复发者, 继服原方仍有效。

典型病例: 蒋××, 男, 57 岁, 农民。1983 年 6 月 19 日初诊。1961 年确诊为“丝虫病”, 一直服用“海群生”。1963 年发现阴囊橡皮肿。1983 年 6 月 19 日尿液化验: 乳糜尿试验(+++), 蛋白(+), 红细胞(++). 脉沉迟, 舌淡有齿痕, 苔薄白微腻。药用: 射干 20 克, 川芎 9 克, 赤芍 12 克。10 剂。6 月 30 日二诊: 尿液转清。尿液化验: 乳糜尿试验(-), 蛋白(-), 红细胞(+). 续服 20 剂。1986 年 3 月随访未复发, 阴囊橡皮肿亦逐渐软化。

体会: 用射干治疗乳糜尿古今本草书籍虽未载, 但我地民间有此单方。用法是鲜者约 10 克, 切细, 与鸡蛋一个搅匀, 再加糯米酒一小杯(约 50 毫升), 久蒸。日服 3 次, 连服七天。疗效亦肯定。笔者通过临床实践认为, 初发者及年老羸弱者用药剂量以 12~15 克为好; 病程长及体质壮实者, 剂量以 20~25 克为宜。同时新病及年轻气壮者, 治愈后复发率高, 而久病年老体弱者, 治愈后复发率低。在服药期间须禁食肥肉、油煎鸡蛋。

四川省秀山县中医院 宋建华 邓秀平