

天英消癥方治疗不孕症 77 例临床分析

武汉市第四医院中医科 周文瑜

本组不孕症病例均为输卵管炎及盆腔炎症所致输卵管粘连、堵塞患者,少数合并黄体不健。作者用天英消癥方共治疗上述不孕症疾患 77 例,妊娠 56 例,现分析如下:

临床资料

本组病例为 23~35 岁。不孕时间 1.5~2 年 23 例,2~3.5 年 43 例,4~10 年 11 例。1.5~2 年组均通过输卵管造影术、通液术及 B 型超声波探测确诊为输卵管粘连、堵塞或积水。

治疗前输卵管通畅试验显示输卵管不通畅或阻力很大者 47 例。输卵管通畅试验包括碘油造影和通气、通液术。为了避免假通畅误诊,通液术后常规作 B 超探测。本组治疗有效病例均选自通畅试验不通后经过 2~14 个月经周期才受孕的患者,故可排除单纯通液术的通管作用。

本组 77 例中,有明显的附件炎、盆腔炎症症状,通过 B 型超声波或妇科检查发现双侧或单侧附件炎患者 51 例(其中包括附件炎性包块 12 例、输卵管积水 13 例、子宫肌瘤 1 例);经造影或手术探查初步诊断盆腔结核所致输卵管疾患 3 例。其余 23 例均无明显的附件炎、盆腔炎症症状,但有不同程度的附件炎、盆腔炎病史及流产史或产后感染史,因输卵管通畅试验显示输卵管不通或欠畅而来就医者。诊断性刮宫诊断为子宫内膜分泌不良或基础体温显示黄体期短(不足 11 天,仅 5~6 天左右)共 21 例。

本组 77 例患者中,原发不孕 42 例,继发不孕 35 例。后者包括初孕人工流产及自然流产 27 例,足月产史 6 例(其中死胎、死产 5 例,顺产活婴 1 例),宫外孕史 2 例。本组病例都有不同程度的肝气郁结,气滞血瘀表现,如乳

胀、小腹疼痛等,36 例中、重度痛经,7 例长期低烧。

方法和结果

一、治疗方法:

天英消癥方系列方剂包括口服方、灌肠方、药包外敷方。三种方剂或单用、或二者并用、也可三者合用。其中单纯用口服方者 68 例;灌肠、口服二者并用 8 例;灌肠、口服、药包外敷三者合用 1 例。

1. 口服方:皂刺 10 克,蒲公英 30 克,柴胡 6 克,白芍 10 克,穿山甲 10 克,红花 10 克,当归 12 克,乌药 10 克,青皮、陈皮各 10 克,路路通 6 克,香附 10 克。每日一剂,每周 5 剂,8 周为一疗程。

2. 灌肠方:皂刺 15 克,蒲公英 30 克,川朴 15 克,生军 10 克,银花藤 30 克。每晚一剂,50~100 毫升保留灌肠,经期停用。

3. 药包外敷方:皂刺 15 克,蒲公英 30 克,路路通 15 克,威灵仙 20 克,乳香、没药各 20 克,红花 15 克,透骨草 15 克,赤芍 15 克。做成包,蒸 40 分钟,双侧下腹各一包,敷 30 分钟,可重复使用 2~3 次,疗程不限。

本组 77 例中有 29 例用过西药,其中 21 例曾配合应用过抗菌素;19 例应用过强的松;21 例应用过菠萝蛋白酶片。

二、治疗结果

本组 77 例,经 3 个疗程的治疗,共妊娠 56 例,占 72.7%。其中治疗一个疗程妊娠 28 例,二个疗程妊娠 16 例,三个疗程妊娠 12 例。治疗三个疗程后仍未妊娠者 21 例。

本组诊断为附件炎者 51 例,治疗后妊娠 33 例(其中包括附件炎性包块 12 例,治疗后

10例妊娠；输卵管积水13例，治疗后8例妊娠；子宫肌瘤1例，治疗后妊娠；输卵管不通并伴有流产史、盆腔炎病史者23例，治疗后均妊娠；盆腔或输卵管结核3例均未妊娠。

77例中，治疗前输卵管通畅试验显示输卵管不通或阻力很大的47例，治疗后28例妊娠，19例未妊娠。合并黄体不健者21例，治疗后13例妊娠，8例未妊娠。本组中有原发不孕42例，治疗后23例妊娠，19例未妊娠；继发不孕35例，治疗后妊娠33例，2例未妊娠。

讨 论

自1975年起我科用天英消癥方治疗附件炎性包块、急性及亚急性盆腔炎、盆腔静脉曲张综合症、子宫内膜异位症取得一定疗效。在治疗上述疾病的过程中，发现有少数因输卵管粘连堵塞所致之不孕症患者，通过天英消癥方口服或灌肠取得了受孕的良好效果。我们从中受到启发，开始将此方用于不孕症的治疗。

天英消癥方以皂刺、蒲公英为主药。其中，蒲公英清热解毒作用强，能消恶肿；皂刺又名天丁，辛散温通，性锐力利，具有消肿、托毒、排脓之功，凡痈疽脓毒未成能消，已成能溃，与本方中穿山甲共为《外科正宗》透脓散之消肿溃脓主药。我们受透脓散的启发，应用皂刺、穿山甲，使其透达输卵管粘连、堵塞之病所；配蒲公英、银花藤（或野菊、贯众）等药，达到

消炎通管之作用。本方还配以柴胡、当归、白芍、香附等妇科良药，疏肝解郁，再加上红花、路路通、青陈皮、乌药行气化痰，使全身气机通畅，加强血流通畅，促进炎症消散，以利于输卵管之通畅。

本文77例患者皆属于肝气郁结、气滞血瘀的辨证类型，部分患者瘀久化热，只有少数患者合并肝肾不足，故主要治则仍采用疏肝理气，活血化瘀，软坚散结，清热解毒。归纳起来为活血化瘀、清热化痰、行气化痰、益肾化痰四法。

王淑贞等认为：输卵管因炎症粘连，堵塞不通畅是导致不孕的主要原因之一，约占不孕症的1/3。他们与日本高野昇均认为：即使粘连不重，但因纤毛被破坏，管壁由于粘连而发硬、僵化，不能蠕动，使精虫活动受限，输卵管即使恢复通畅，但妊娠率为零或是很低，所以这仍然是不孕的原因。本组77例妊娠率达72.7%，且无一例宫外孕发生，这一点值得引起注意与探讨。附件炎急性、亚急性发作时，不得勉强施行通畅试验手术，以免炎症扩散，使病情加重。

本组77例中，21例经天英消癥方治疗后未妊娠，其中原发不孕19例；盆腔或输卵管结核3例，3例基础体温呈低平曲线。说明天英消癥方对上述疾病疗效不够理想，今后应在配合用药和方剂加减上再下功夫。

《中 医 百 家 言》开 始 征 订

应广大读者的要求，《中医杂志》编辑部已将1980~1985年刊载于《中医杂志》“读者园地”和“百家园”的文章，精选汇编成册，定名为《中医百家言》。该书内容丰富，有著名学者、专家的笔记、心得；有中青年中医的学医随笔；有丰富多彩的杏林正偏、药园漫话；有广博深邃的内难经研讨，伤寒、温病发微。全书颇具知识性、

趣味性，多数内容为中医教科书所不载。雅俗共赏，堪为中医、西学中及自学人员提高水平、增加知识的参考。

该书由山西科教育出版社出版，定价1.75元，1986年内出版。欲购者请将本人姓名、地址写清楚，把书款（及邮挂费0.20元）汇至山西省太原市东陵里2号《中医药研究杂志》发行处。