

陆 渊 雷 医 案 选(续)

汤 叔 良 整 理

八、外感咳逆津伤案

李太太 咳甚，剧至翻呕，头痛涕出，恶寒，是有外感；舌光剥，大便秘，脉细，是津液伤，故不能食。不可不表，又不可大表。

麻黄 3 克，炙兜铃 10 克，柴胡 6 克，云茯苓 13 克，杏仁 10 克，天麦冬各 10 克，黑附块 6 克，炙甘草 3 克，炙紫菀 10 克，丹参 10 克，川贝母 10 克，生姜 3 片。

二诊：据述头痛阵咳略减，日午仍呕，胃口刷不佳，涕出未止，仍当增津液、健胃、兼解外邪。

麻黄 2 克，太子参 10 克，天麦冬各 6 克，鸡内金炭 5 克，白芍 6 克，谷麦芽各 10 克，川象贝各 5 克，桔梗 5 克，杏仁 6 克，陈皮 6 克，前胡 6 克，清炙草 3 克。

按：既有表证，自当解表，然仲景有“咽喉干燥者，不可发汗”之训，示阴津不充者，当慎用汗法。今舌光剥，脉细便秘，津伤之象甚著，故曰：“不可不表，不可大表。”方取麻黄附子甘草汤，以两解太阳、少阴之邪；加天、麦冬益阴充津，养其汗源；杏仁、川贝、兜铃、紫菀宣肺化痰，止其咳逆。伤寒家以“颇欲吐”有传经之嫌，故用柴胡以达少阳，杜其传变；助以茯苓、生姜和中止呕。

二诊当是阳气较振，表证转轻，而津伤未复，胃口刷不佳，故去附子、生姜等刚燥辛散之品，而以益气生津、和中醒胃为主，兼以解表疏邪，宣肺化痰，安内以攘外。

九、太阴、少阴、少阳合病寒热案

陆世兄 病二旬，寒热起落，夜则高，今脉濡弱而数，舌非常白腻，口苦而淡，当治其寒湿，强其心脏，解其少阳。

炒茅术 13 克，黑附块 6 克，柴胡 6 克，六

一散(包) 10 克，赤苓 15 克，干姜 3 克，姜半夏 10 克，苡仁 15 克，太子参 10 克，淡黄芩 6 克，生姜 3 片，红枣 4 枚。

二诊：药后，见高度之寒热，咽头之痰遂去，然舌白腻，脉仍数弱，有寒湿，口苦欲呕，仍属少阳。

川厚朴 5 克，姜半夏 10 克，柴胡 6 克，太子参 6 克，黑附块 6 克，鲜藿梗 13 克，生茅术 10 克，陈皮 6 克，淡黄芩 6 克，干姜 3 克，青蒿(后下) 6 克，苡仁 13 克。

三诊：服第二方后，热度起落低而暂，口苦亦减，舌仍萎而白腻满布，脉濡数，大便干而难，当酌予通下之。

生茅白术各 6 克，瓜蒌仁 10 克，赤茯苓 13 克，柴胡 6 克，太子参 10 克，枳实炭 10 克，苡仁 15 克，清炙草 3 克，黑附块 6 克，山楂炭 10 克，苏藿梗各 6 克。

四诊：仍时时有微热，渐少食，无食思，舌萎白甚，脉弱数略滑，大便硬，头晕难入寐，须清理肠胃。

白术 10 克，陈皮 6 克，黑附块 6 克，鸡内金炭 6 克，干姜 3 克，姜半夏 10 克，酸枣仁(研) 10 克，生怀山药 13 克，太子参 10 克，朱茯神 13 克，山楂炭 10 克，清炙草 3 克。

五诊：眠食大便俱好，精神亦稍振，惟时或有微热，卧时手足易麻，当兼以补血调营卫，舌上湿已将尽也。

太子参 10 克，干姜 3 克，当归 6 克，苡仁 13 克，炙甘草 3 克，白术 10 克，黑附块 5 克，桂枝(后下) 3 克，生姜 3 片，生黄芪 13 克，云茯苓 13 克，白芍 6 克，红枣 4 枚。

按：此例病经三候，仍寒热口苦，是少阳证未罢；脉濡，舌苔白腻，乃寒湿内蕴之象；

脉数而弱则为病传少阴之征兆。以其少阳、太、少两阴三经证兼见，故首方予小柴胡与四逆、理中之合方，分主三经之证。

二诊仍是三经合病治法。惟寒湿太甚，去赤苓、六一散之甘淡渗利，改用川朴、陈皮、藿梗合茅术、半夏为不換金正气散以芳香化浊，苦温燥湿；因证见高度之寒热，遂入青蒿，俾助柴胡增强和解少阳之力。

三诊和解化湿既已应手，寒热起伏低而短暂，是少阳证欲罢未罢，且兼大便干而难，正是大柴胡汤所主，以病人入虚，故以薤仁代大黄酌予通下。

四诊热势顿挫，虚象毕露，乃用六君子汤加枣仁安神，楂肉、鸡金和中导滞，以补消并进。

五诊邪退正虚，偶有微热，卧则肢麻，示营卫不和，气血两虚。遂融当归建中汤、黄芪桂枝五物汤、四君子汤于一方以善后。

本例初诊时，脉弱而数，迄于四诊，仍未改观，可见其阳虚之甚，设非始终倚重姜、附，则亡阳厥逆之变，殆不能免。

十、少阳伤寒阳虚湿盛案

李先生 伤寒十日许，侵晨恶寒发热，人已虚，脉数而弱，大便难，口苦甚，舌白腻，中间微黄，胸满腹胀，是为邪实正虚。

柴胡6克，姜半夏10克，苡仁13克，生姜3片，淡黄芩6克，太子参10克，赤苓10克，红枣4枚，藿香梗10克，黑附块10克，清炙草3克，川厚朴5克。

二诊：舌苔仍白厚略腻，大便溏，腹候软，脉稍滑，胸闷，神气颇虚，但此时仍须祛邪。

柴胡6克，黑附块6克，郁金5克，清炙草3克，淡黄芩6克，茅白术各10克，藿香梗10克，生姜3片，枳实炭6克，姜半夏10克，赤苓13克，太子参10克。

按：此证“胸满口苦甚”，为邪郁胆府之征；“寒热作于侵晨”而脉弱，阳虚而正邪分争之象；腹胀便难，舌苔白腻中间微黄，参以脉弱晨热，其为阳虚湿盛，脾运失常甚明。故予小柴胡汤运枢机、和少阳；藿、朴、夏、苓宣

化湿浊；辅以附子扶阳却邪，以助脾运。药后，便通腹软，证情顿挫，然舌仍白厚略腻，提示湿邪尚盛，故虽“神气颇虚”，但“此时仍须祛邪”。二诊以二术易苡、朴，重加运脾化湿，俾湿去脾健而气血之生化有源。

十一、食积吐利阳虚阴亏案

王宝宝 期岁有余，身热无汗，吐利完谷不化，发育不足，甚羸瘦，小便少，脉弱而数。

川连1克，太子参10克，云茯苓10克，红枣4枚，桂枝尖(后下)3克，干姜2克，炙草3克，淡吴萸3克，姜半夏10克，焦白术6克，六神曲10克。

二诊改方：据云转泄利恶臭，呕已瘳减，脉甚数，当防心脏衰弱。

生白术6克，黑附块5克，炒扁豆花10克，云茯苓10克，太子参6克，焦麦芽10克，炙甘草3克，干姜3克，枳实炭5克。

三诊：利较瘳，得乳辄吐利如水，舌红刺如荔枝，此胃液伤，又有积也。

西洋参10克，生白术6克，柴胡6克，黑附块5克，原钗斛10克，制军炭3克，鲜茅根10克，姜半夏10克，山楂炭10克，枳实炭6克，炙草3克，生姜2片。

四诊：危险悉除，昨日药后遂不利，舌上刺亦去，今日脉颇安和，惟身津润汗出，则阳虚甚，不宜多衣被。

西洋参6克，原钗斛10克(上二味另煎冲)，干姜2克，煅牡蛎25克，炒白术10克，谷麦芽各10克，生黄芪13克，姜半夏10克，云茯苓10克。

按：方书以数脉属热证，然《医方集解》引薛慎斋语云：“人知数(脉)为热，不知沉细中见数为寒甚。真阴寒证脉常有七八至者，但按之无力而数耳，宜深察之”；通常以发热为阳证，然先生指出：“发于阴之病，殊非绝对不发热者……学者勿执定少阴无热可也”(《伤寒论今释》)。此例患儿发育不足，形体羸瘦，吐利完谷而脉数且弱，虽伴发热，其非阳证，热证甚明。是以初用吴茱萸汤合桂枝人参汤，从太阴立法。方中黄连用量特轻，取其苦降之性以

名医验方

元 明 粉 散

山东中医学院 周凤梧

一、药物组成：元明粉 10 克。

二、适应证：小儿强中证，即阴茎无故坚硬勃起，久久不萎。

三、制法：元明粉以纱布包扎。

四、用法：每晚睡前外敷两手心，连用一周。

五、验案举例：刘××，男，3岁。1983年4月10日初诊。家长代诉：患儿阵发性阴茎勃起5个月，加重2个月，日发20余次，每次持续数分钟，发作时痛苦哀号，且多于早晨醒后发作，晚上发作次数较少。患儿体质一向虚弱，自出生3个月始，便腹泻、呕吐反复发作，至两岁时方愈。该病起自1982年11月，突然频繁呕吐，同时阴茎勃起，腹部痛楚难忍，哭闹不安，日发3~5次，每次数十秒钟。后经中医推拿，西医对症治疗，十几天后渐趋平复。1983年1月，因感冒发烧，鼻衄，引起旧恙，发作频繁，且逐渐加重，竟日达20余次，每至发作，痛苦哀号，用力掐捏阴茎，要求家长将其

割去。曾就诊于中医，服过知柏地黄汤加减40余剂，不见功效，遂又到某医院神经科治疗，该院以“勃起待查”的结论，给予维生素B₁、B₆、γ-酶氨酸治疗，仍无寸效，后又求治于×院推拿科，治疗10天不见好转，乃转诊于余。诊视患儿发育一般，面色憔悴，食欲不振，口干多饮，常有鼻衄、便秘，舌红苔少而燥，脉弦。审其舌脉，度其病情，确诊为“强中”。考虑患儿长期服药，有厌药情绪，故暂不给药内服，拟外用元明粉消息之。遂处方：元明粉10克，以纱布包扎，每晚睡前外敷两手心，连用1周。4月16日复诊，发作次数明显减少，胃纳见好，再照方外用3次病竟全瘥。家长坚请给方巩固，遂疏内服方，用大补阴丸合玉女煎化裁，以滋阴潜阳，兼清阳明，少佐肉桂引火归原，药用：生地黄12克，炙龟版9克，知母6克，黄柏6克，生石膏24克，麦冬6克，北沙参6克，上肉桂1.5克。水煎服，日1剂。药进6剂后，停服观察。追访1年，未见复发。

为反佐，以免格拒热药不受。

二诊太阴之寒稍杀，而脉数更甚，已见病传少阴之端倪，故用附子理中为主，兼顾太、少两阴。先生尝云：“少阴病者，心力不振，全身机能衰减之病也”（《伤寒论今释》）。故案中指出：“当防心脏衰弱”。

此例系吐利失治而病延太、少两阴，究其所以吐利之故，当由体弱脾虚，乳食停积而然。经迭投姜、附、萸、术后，中阳渐振，乃由此前之吐利完谷，一变而为泄利恶臭，食积之本未而目，至此而始彰，因予大黄、枳实推荡积滞，通因通用也；佐半夏降胃以止吐逆；茅根

分利而不伤阴；柴胡“去肠胃中结气，饮食积聚……推陈致新”（《本经》）；虚人积滞，最忌偏任消导，以免戕伐脾元，故用枳实与参、术为伍，消补并用；小儿为稚阴稚阳之体，吐利不已，脉弱甚数，阳气先虚，“舌红刺如荔枝”，阴津亦伤，亟宜阴阳兼补，故以附子温其阳，洋参、石斛救其阴。药入利止，舌上刺已除，脉亦安和，惟自汗津津，乃气阴两虚、卫外不固，故以参、斛益气阴，术、姜培中阳，黄芪补气固表，牡蛎敛阴止汗，谷麦芽、苓、夏醒胃和中，以善其后。（续完）