

肾、肝肾亏损应滋补肝肾等。约服药 10 天。
(2) 排卵期：在上述经后期用药的基础上加用温阳活血药，常选用仙灵脾、巴戟天、肉苁蓉、乌贼骨、生茜草、丹参、泽兰、泽泻等；若阳虚重时加附子、肉桂以振奋卵巢机能，促进排卵。约服药 5~7 天。(3) 行经前期及行经期：行经前期的治疗是在上述经后期用药的基础上，加活血调经药，常用当归、川芎、丹参、鸡血藤、赤芍等；而至行经期则在行经前期治疗的基础上，再根据经行时所出现的症状随证加减用药。如乳房胀痛加娑罗子、橘叶、橘核、荔枝核；腰痠加桑寄生、川断、杜仲；痛经加白芷、元胡；少腹冷加小茴香、肉桂、紫石英等。本文中所介绍的许多不孕者，皆是先调经，于经水正常、经行症状减轻或治愈之后而受孕的。

肾藏精，胎脉系于肾。如肾气旺盛，则月经正常，生殖发育功能亦就旺盛；肾气不足则生殖功能衰退。就本文所统计的资料来分析，与肾不足有关的不孕患者共 160 例，占 62.3%，故在治疗时应抓住肾这个生殖发育的根本。在补肾中，多阴阳平补，笔者常用五子衍宗丸、左归丸、右归丸为基础方。在补肾之中要注意阴阳的辩证关系。张景岳指出：“善治阳者，必于阴中求阳，则生化无穷；善补阴者，必于阳中求阴，则泉源不竭。”在治阳时加用补阴药，补阴时加用温阳药，如此能阴生阳长，可避免孤阴不生，独阳不长之弊端。为使肾气盛笔者还常佐用以下三种方法：(1) 补脾扶佐肾气。脾为后天之本，气血生化之源，脾充才能精足，以后天养先天。(2) 补冲、任、督脉扶佐肾气。冲为血海，妇女以血为本，冲脉盛则月经会如期来潮。任脉为一身阴脉之海，凡精血津液都属任脉所司，任脉为妊养之本，故有“任主胞胎”之说，任脉盛才能月经正常及孕育正常。督脉主一身之阳，有一身阳脉之海之称。任脉行人身之前，督脉行人身之后，行于脊柱内。督脉贯脊属肾，任脉与督脉前后交会，循环往复，维持着人体阴阳气脉的相对平衡。冲、任、督三脉同起于胞中，同源而三歧。若补益

冲、任、督脉则益于肾元，利于孕育。(3) 血肉有情之品扶佐肾气。血肉有情之品可直接填精补髓，补益肾精，常用药物有龟板、鹿角胶、坎炁、河车、黄狗肾、淡菜等。

本文统计输卵管不通患者为 61 例，占 23.7%。对输卵管不通患者应以破瘀药治疗为主，常用药是三棱、莪术、苏木、地龙、蜜虫、水蛭、蜈蚣、穿山甲等。除用破瘀药为主外，治疗时还应掌握三个结合。(1) 标本结合。如因炎症引起的输卵管不通，除破瘀药外还需加清热解毒药，常用红藤、败酱草、蒲公英、半枝莲、黄柏等；如因结核性者还需加用黄芩、百部、鹅管石、功劳叶等。(2) 软破结合。即软坚药与破瘀药相结合。软坚药易使结缔组织松软，易使粘连组织消散，使输卵管通畅，常用软坚药有川贝、黄药子、牡蛎、夏枯草、象贝、海藻、海带等。(3) 攻补结合。破瘀药能伤正气，故用破瘀药治疗 2 个月后应加用补益气血之药，常用党参、黄芪、白术、白扁豆、淮山药、黄精等。除上述三个结合外，治疗输卵管疾患还常配用下述五种治法：理气活血法、祛瘀止痛法、清热解毒法、软坚散结法和温阳调经法。如此选择配用，多能取得较好的疗效。

土鳖虫煎剂引起过敏 反应 1 例报告

中国人民解放军第 262 医院 张会川

一中年女性患者患雷诺氏症，辨证为脾阳虚衰，处方四逆汤加味。治疗三个月后，病情好转，末次月经色黑有块，腹痛，笔者于原方加土鳖虫 10 克。2 剂后，四肢、躯干皮肤先后出现充血性丘疹，瘙痒；患者未曾在意，再服三剂后，皮疹融合成片、面部也出疹，痒甚，压之退色，患者此时始停服中药，以扑尔敏、维生素等对症治疗，皮疹渐消。剔除余药中之土鳖虫后煎服，无不良反应。而于一剂药中留下土鳖虫 3 克，再服半剂后，四肢皮肤又出现瘙痒性红色充血性丘疹，证实此属过敏反应。考虑可能是昆虫之异性蛋白刺激引起机体的变态反应，建议临床中凡属过敏体质者应慎用动物药为妥。