

五、毒副作用观察

我们所观察的重楼排草组产妇286例,未发现明显副作用,临床各种检查和化验,如心电图、血常规、血小板计数、出血时间、凝血时间等,均未见明显影响,少数产妇的某些项目检查的结果,超出正常范围,但安慰剂组也有类似情况,两组比较没有明显差异。

讨 论

一、预防和减少产后出血是围产医学重要研究课题之一。目前临床上预防和治疗产后出血,多用宫缩剂催产素和麦角新碱。这两种药均需注射,不便于广大农村产妇应用。麦角流浸膏虽可口服,但副作用大,市场上已停止出售。其他如益母草、当归、红花等对动物子宫收缩作用不够强,临床效果也不够满意。重楼排草系来自民间治疗产后出血的有效单方,在鄂西地区应用甚广。我们通过对597例的临床观察,结果证明,重楼排草对减少产后出血、促进子宫复旧,效果明显,其作用类似麦角新碱。重楼排草能口服发挥作用,且药源广,价格廉,适合于广大农村家庭应用。

二、动物实验证明,重楼排草对家兔、豚鼠、大鼠、小鼠的离体子宫以及家兔的原位子宫和子宫瘘子宫均有明显的兴奋(收缩)作用⁽²⁾。我们还利用利凡诺引产作羊膜腔穿刺和水囊引产时上水囊之便,在穿刺针和水囊的导管上接压力传导系统,测量宫内压,结果证明重楼排草对妊娠子宫有收缩作用,其收缩作用时间与麦角新碱相似。其作用强度不及催产素,但作用时间较催产素持久。

重楼排草对妊娠子宫的作用只观察了6小时,是否能用于引产,尚待进一步研究。

三、重楼排草在民间应用时间很久,没有明显的副作用。我们临床观察也未发现明显毒副作用,心电图、肝功能、肾功能、血常规、尿常规、出凝血时间等检查与安慰剂组比较无明显差异。产后随访对乳汁分泌亦无明显影响。证明重楼排草毒副作用小,安全可靠。

参 考 文 献

- (1) 恩施地区人民医院妇产科:红四块瓦煎剂防治产后大出血疗效观察。内部资料,1975。
- (2) 何功倍等:重楼排草对家兔、豚鼠、大鼠、小鼠子宫的作用。中成药研究(10):28,1986。

健脾八珍糕治疗脾胃虚弱介绍

江苏省高邮县中医院儿科 吴声宏 邱丽萍

八珍糕系传统名产,历史悠久,古名八仙糕,后人易名为八珍糕。该品具有健脾益胃的功能,主治因脾胃虚弱而引起的消化不良,腹胀便溏,面色萎黄,体弱形瘦等症。对幼老体弱及病后体虚、脾胃虚弱的患者,尤为有效。

本县八珍糕厂生产的健脾八珍糕是根据清代名医汪昂著《汤头歌诀》所载处方制成,主要成分为党参、白术、茯苓、山药、莲子、芡实、苡仁、扁豆、陈皮、米粉等,突出了健脾和胃之功效,故称为健脾八珍糕。服法是每日早晚饭前服用,成人每次3~4块,小儿每次1~2块。用于临床,确有实效。

病案举例:梁××,男,7个月,人工喂养。患儿因早产先天禀赋不足,后天调养失宜,以至出生后大便溏薄,多见食后作泻,色淡不臭,时轻时重,时

发时止,面色萎黄,形体消瘦,舌淡苔白,脉细无力。查体:Ⅱ度营养不良,心肺正常,腹软,神经系统(一),血红蛋白7.5克%,红细胞240万/毫米³,大便镜检见脂肪球(++).予健脾八珍糕一日二次,每次二块,做成米糊,用奶瓶喂入。患儿1个月后,大便日行一次,食欲正常,体重增加,继服6个月,营养发育一切正常。

婴幼儿时期,由于小儿脾常不足,运动功能尚未健全,而生长所需水谷精气,却较成人更为迫切,加上小儿寒暖不能自调,饮食不知自节,一旦调护失宜,常易为饮食所伤,出现积滞、呕吐、泄泻等症。健脾八珍糕功在健脾益胃,倘得脾胃一旺,则脏气有所禀,符合“治病必求于本”的治疗原则。同时,健脾八珍糕香甜可口,味道纯正,小儿易于接受。