

药配伍,相使为用。果痞闷解,浮肿退,诸症消失,其病速愈。

十四、引火归原

安某,男,72岁。1985年12月7日初诊。

患高血压病已20余年(血压210/110毫米汞柱),面浮,头胀,少寐,耳鸣,眼花,腰痠,夜尿频数,苔白,脉弦细。证属上盛下虚,肝肾不足。处方:

制附块6克,败龟板9克,女贞子9克,

旱莲草9克,何首乌15克,磁石30克,丹参15克,石决明24克。

服药7剂诸证缓解,血压下降(180/90毫米汞柱)。

按:姜老说:“本案高血压病属于下虚上盛,用附子温下,常可使上盛减轻,也即引火归原。”龟板育阴潜阳与石决明相配,用于肾阴不足、上盛下虚之症较为适宜,药后取得显著疗效。

自拟青茵合剂治疗非胆总管胆石症

中医科 贾汇泉
本溪钢铁公司职工总医院
功能科 周维

三年来,我们单纯采用自拟中药青茵合剂治疗胆石症67例,取得较好的疗效,现报道如下。

一、临床资料

本组治疗胆囊结石和肝内结石共67例,其中男性37例,女性30例;年龄20~40岁13例,40~50岁19例,51~60岁29例,60~70岁5例,70岁以上1例;病程最长者5年,最短者半年。

结石部位:胆囊结石43例、肝内结石24例,全部病例均有右上腹或上腹部痛反复发作病史,就诊时有腹部隐痛、恶心、轻度呕吐,无明显黄疸,伴有右肩背放射痛。

检查:病人用药前均作血、尿常规化验,肝功能检查,并用B型超声显象确诊。

胆囊结石单发26例,多发17例,最大直径1.6厘米,最小直径0.3厘米;肝内结石单发13例,多发11例,最大直径2.4厘米,最小直径0.3厘米;按中医分型,气滞型9例,湿热型58例。

二、治疗方法

单纯口服青茵合剂(青皮50克,茵陈50克,大黄15克,郁金30克,槟榔20克,香附15克,元胡15克,砂仁15克,鸡内金15克,金钱草30克,片姜黄10克)。用法,一剂水煎至约200毫升,分两次早晚服,每服6剂停药一日,可间断服药30至60剂。同时根据病人体质强弱作单味药上的剂量变化。

三、疗效观察

治愈,结石影象消失、症状及体征(一)。

好转,结石影象缩小,症状明显减轻,体征不明显。

无效,结石影象无变化,症状减轻,体征或存。

肝内结石共24例,治愈12例,好转10例,无效2例。

胆囊结石共43例,治愈10例,好转26例,无效7例。

总有效率86.6%,随访病人65例,最短者2个月,最长者3年,有4例胆囊结石复发。

四、典型病例

蔡××,女,48岁,干部。右上腹阵发性疼痛反复发作5年。伴有轻度恶心和呕吐。1983年6月7日经B型超声显象证实为胆囊内结石共4块,大者0.6×0.9厘米。肝功能正常、肝脾未触及。

中医临证所见:面色萎黄,形体消瘦,纳呆食少,尿黄,大便秘结,右胁下隐痛、拒按,脉象弦细,舌苔薄黄而腻、舌质淡红。

辨证,病属肝失疏泄,肝胆郁滞,腑失通降。

治法:疏肝利胆、理气解郁、通腑降浊。

中药处方为青茵合剂,服法如前,并嘱病人服中药治疗期间留便查石,共服中药31剂,症状及体征消失。唯停药后大便仍稍稀,每日2~3次,但始终未查到胆石。后改拟补脾中药六君子汤三剂。大便正常。1983年7月21日经B型超声显象复查,指示为正常肝胆回声区,结石影象消失,于1986年3月再次复查,未见结石。