

排泄,也使停留于体内的残瘀败精得以疏泄,排出体外,促使病情好转。

李超(中国人民解放军第151医院):余对前列腺炎的治疗,以活血解毒、通闭解结为总则。主药为川芎、赤芍、丹参、栀子、连翘、白头翁、地榆。临床时可随症加减。

(1)气虚血瘀者,久病不愈,体质衰弱,精神不振,舌质淡,脉无力。药用:川芎10克,丹参15克,连翘20克,党参15克,炒白术10克,茯苓15克,甘草10克。

(2)阴虚火旺者,有小便黄,大便结,掌心热,舌质红,脉数而无力。药用:川芎6克,连翘20克,生地榆15克,黄柏10克,知母15克,生地15克,丹皮15克,杞子10克。

(3)湿热郁发者,即慢性前列腺炎急性发作,症见小便黄浊淋漓灼痛,口渴喜冷饮,舌质红苔黄腻,脉弦数。药用:丹参15克,赤芍15克,栀子10克,连翘20克,白头翁15克,野菊花20克,紫花地丁30克,车前草30克,蒲公英30克。

(4)壅阻尿闭者,药用:川芎6克,丹参

15克,连翘20克,熟附片3克,肉桂粉1克(冲服),熟地15克,猪苓15克,泽泻15克,三七粉1克(冲服)。

对本病的治疗,经长期临床应用观察,已由主方加味,制成了“前列腺栓”,通治前列腺病,疗效满意。

谢辅弼(重庆市中医院):前列腺炎有急慢之分。急性者实证居多,为湿热胶结、瘀阻下焦,临床除常规辨证治疗外,若见有瘀阻尿道者,可酌加地龙、琥珀、冬葵子、萆薢清热解毒、化瘀利窍;尿道灼热,加淡竹叶、木通;血尿加白茅根、瞿麦;尿浊加萆薢、土茯苓,阴部潮湿多汗,加苍术、黄柏、苡仁。慢性者病程较长,虚实夹杂为多,并与前列腺肥大相互为患,治疗多扶正祛邪。如少气神疲,排尿无力,尿后余沥不尽,宜补脾益气,升陷除湿,用调中益气汤加肉桂1克以利气化;如头晕耳鸣,腰痠尿频,宜补益脾肾,用大补元煎加肉桂3克;如五心烦热,盗汗,宜滋养肝肾,清热除湿,用知柏地黄汤合三才封髓丹,佐肉桂1克。

杨树皮煎汤热熏治疗面瘫30例

江苏省泰兴县中医院 吴汉民

1981年以来,笔者以杨树皮煎汤热熏治面瘫计30例,有一定效果,现小结如下:

一、一般资料:本组男性14例,女性16例。发病部位,右侧者16例,左侧者14例。年龄最小者7岁,最大者75岁。病程1~60天,平均15天。

二、治疗方法:取鲜杨树皮60~100克,加水1000毫升左右,煎沸后乘热熏患侧面颊部,器皿下置小炉,文火缓缓加温,使热汽持续而均匀,每次40~60分钟。热熏一次未恢复正常者,隔两天行第二次或第三次治疗。热熏三次无显著效果者,改用它法。

三、治疗结果:30例中,痊愈17人,占56.7%,其中治疗一次而完全恢复者3人,两次而恢复者9人,三次而恢复者5人。显效6人,占20%。总有效率为76.7%。无效者7人,占23.3%。

四、典型病例:刘××,男,59岁。1982年12

月2日下午,突然发生右侧面瘫,右眼不能闭合,口角左斜。曾在医院针灸数次,因针处轻度肿胀疼痛,转来诊治。以上法治疗,热熏50分钟,右眼已能闭合,但口角尚微左偏,用力吹气时有漏气情况。三日后又施本法,治疗后,口角已正,患侧面额出现皱纹,面部表情及各项功能完全正常。

五、体会:杨树皮系指杨柳科植物旱柳 *Salix mandschurica* 的瘤瘤皮。《辞海》载其皮含单宁或柳酸。治疗机理尚有待研究。笔者曾以单纯水蒸汽或牵正散药渣煎汤热熏治疗面瘫患者10多人次,并未见治疗作用,故可初步排除物理因素的作用。从临床使用情况分析,本法对病程较短的、单纯性面瘫效果满意。发病年龄与疗效关系不大。若发病时间较长或有较多合并症者效差。其中有一例病人为第三次复发治疗及时,亦未能见效。