

低血小板粘附率的作用。据实验及临床观察,蒲黄有降低血小板粘附率的作用。大黄有效单体d-儿茶精及没食子酸有增加血小板粘附功能作用,有利于血栓形成,结合其他指标观察具有促进血液凝固作用。

六、结语

冠心病血瘀证的研究是中医活血化瘀临床应用与研究中最为活跃的领域之一。根据中医传统理论“不通则痛”,冠心病人气虚或气滞均可造成血瘀。用现代医学的方法对其客观检测指标作了大量的探讨表明,微循环、血液粘度、血小板粘附性、聚集性等许多指标在血瘀证病人有较为显著的改变,可作为血瘀诊断、分级判断、疗效判断、预后分析,甚至有可能作为血瘀证预测的客观指标,其重要性愈来愈引起重视。

冠心病血瘀证病人常有虚实夹杂,兼有痰浊、气滞之实证,或有阴虚、阳虚等虚证表现。故治疗上应以活血化瘀为主,根据其兼证适当加减药味。但由于这类病人多为本虚标实,疼痛明显时,急则治标,临床应用活血化瘀药或活血化瘀制剂常能取得明显的效果,因此,冠心病片、丹参片等许多治疗冠心病心绞痛的活血化瘀成药得到十分广泛的应用,并取得较好的临床效果。近年来开始注意到,将活血化瘀药制成长效、速效制剂,多途径给药,扩大了应用范围及适应症。

活血化瘀疗法治疗冠心病作用机制研究表明,其作用包括改善心功能、扩张血管、改善心肌供血供氧、改善血液流变性、降低高粘附状态、降低血脂等多个方面,不仅为临床研究提供了依据,而且从活血化瘀药中分离出丹参素、川芎嗪、赤芍精、毛冬青甲

素等许多有效药,展示了活血化瘀工作的良好前景。

参 考 文 献

- (1) 活血化瘀专业委员会:待发表。
- (2) 金惠铭:中西医结合杂志 3:182, 1982。
- (3) 翁维良等:中医杂志 (1):46, 1982。
- (4) 西苑医院:中华内科杂志 2:37, 1976。
- (5) 翁维良等:北京医学 (2):88, 1983。
- (6) 上海第二医学院:上海中医药杂志 (2):46, 1983。
- (7) 何渝生等:中西医结合杂志 4(10):586, 1984。
- (8) 翁维良等:中医杂志 (12):40, 1980。
- (9) 翁维良等:天津中医 (2):33, 1984。
- (10) 翁维良等:中华心血管病杂志 12(3):183, 1984。
- (11) 上海第一医学院:中华心血管杂志 8(4):249, 1980。
- (12) 翁维良等:中西医结合杂志 6(2):82, 1986。
- (13) 李鹏等:活血化瘀研究。194页,上海科技出版社, 1981。
- (14) 许青媛等:中西医结合杂志 5(5):265, 1985。
- (15) 翁维良等:杂病证治。59~60页,人民卫生出版社, 1983。
- (16) 郭士魁等:活血化瘀文选选辑。1页,重庆科技文献出版社, 1980。
- (17) 盖祥先:吉林中医药 (4):27, 1982。
- (18) 上海中医学院等:内科学。335页,上海科技出版社, 1980。
- (19) 翁维良:山西医药杂志 13(5):300, 1984。
- (20) 阜外医院、西苑医院:心脏血管病杂志(6):22, 1978。
- (21) 西苑医院等:中华心血管杂志 (2):85, 1982。
- (22) 上海丹参协作组:心脏血管病杂志 (2):1, 1974。
- (23) 上海华山医院:中华医学杂志 56:686, 1976。
- (24) 上海丹参协作组:心脏血管病杂志(1):5, 1974。
- (25) 戴瑞鸿等:活血化瘀研究。30页,上海科技出版社, 1981。
- (26) 郭金广:中级医刊 (9):48, 1984。
- (27) 翁维良等:中药通报 (5):38, 1984。
- (28) 何渝生等:中西医结合杂志2(1):15, 1982。
- (29) 李德伟等:陕西中医5(10):11, 1984。
- (30) 翁维良等:北京医学 8(2):101, 1986。

银 防 芷 酱 汤 治 疗 中 耳 炎

大连制药厂卫生所 谢英琦

大连卫生学校附属医院 汪俊著

方药组成:金银花25克,败酱草25克,白芷7.5克,防风10克。水煎服,日服二次。儿童用量酌减。

病案举例:

随××,女,39岁。突然左耳内疼痛,伴同侧头痛3天。经某院诊为急性卡他性中耳炎。服此方3剂痊愈。

冯××,男,24岁。夏天游泳后右耳流脓,右侧面部肿痛,伴耳鸣。经某医学院附属医院诊为慢性中耳炎,用青霉素、庆大霉素肌肉注射及局部用双氧水、滴耳油等不愈。间歇性流脓一年余,经服银防芷酱汤9剂痊愈。此后未再复发。

按:银防芷酱汤主要功能在于清热解毒,散瘀排脓,消肿止痛。适于急、慢性中耳炎患者。