

化瘀;在补肾中阴阳俱补,略侧重补阳。升白片方剂中的补骨脂、淫羊藿、胎盘粉、女贞子、山萸肉等补肾填精;黄芪、大枣健脾益气;当归、鸡血藤、丹参、三七养血化瘀。据报道,所选药物中补骨脂、女贞子、淫羊藿、胎盘粉、山萸肉、黄芪、鸡血藤、虎杖等均有提升白细胞的作用,我们的实验亦证明升白片具有促进小鼠骨髓多能干细胞及粒系祖细胞的增殖作用,其作用可能与该药的升高白细胞效果有关。

非化疗升白片组177例,有效以上者156例,

占88.1%,其中服药1~2个疗程即达有效以上者117例,可见大部分病例用药1~2个疗程就能获效。本文用升白片治疗的223例中,仅9例有轻微不良反应,6例口干欲饮,3例眼干,所以该药无明显副作用。

参 考 文 献

- (1) 吴祖泽. 造血干细胞动力学概论. 第1版. 北京, 科学出版社, 1978:119.
- (2) 谢仁敏, 等. 中药对体内扩散盒小鼠造血干细胞作用观察. 中医杂志. 1981; 22(5):396.

疱疹净冲剂治疗儿童口腔病毒感染 136 例

中国人民解放军 411 医院 郭 重 仪

口腔病毒感染以小儿多见,其特点是患儿发热流涎、颌下淋巴结肿大压痛,口腔内出现红色斑疹,继而成针尖大小疱疹、互相融合成簇,很快破裂形成边缘不规则的溃疡,遍布口腔或咽峡粘膜,疼痛剧烈,吞咽困难,拒食、继发脱水,精神萎靡,啼哭不安,目前尚无特效疗法。我们于1982年开始在辨证论治的基础上,选出一组以驱风清热解毒为主方剂制成冲剂,经136例临床观察,3天治愈率达84.55%,兹报道如下。

一、临床资料

1. 成份:冲剂为含糖粉粒型,每包重30克,内含生药:紫草9克,蒲公英15克,薄荷3克,水蜈蚣9克,赤芍9克。

2. 服用方法:1日4次,每次半包、开水冲服。成人加倍。

3. 疗效评定标准:治愈:药后3天内(72小时)体温降至正常,疼痛消失,可进饮食,溃疡愈合,或已大部愈合。有效:药后3天体温已下降,尚未正常,疼痛已减轻,溃疡4~6天愈合。无效:药后3天发热不退,疼痛未见减轻,溃疡4~6天尚未愈合。

4. 观察结果:136例8个月~12岁患儿,其中72.2%为1~2岁幼儿,均有口腔粘膜或咽峡密集簇形溃疡,发病2~3天,其中发热38.5~39.5℃76例,全部仅服疱疹净冲剂治疗,不用其他辅助药物。24小

时后退热28例;48小时退热18例;72小时退热共13例、3天总退热率77.63%。24小时疼痛减轻69例;48小时减轻24例;72小时减轻15例,3天内疼痛减轻率79.4%。口腔溃疡愈合情况:48小时愈合46例;72小时愈合69例;3天溃疡愈合共115例,占84.55%。其余25例在6天内全部愈合,故全部有效。

二、典型病例:

患儿叶×,女,14½月,体温39.6℃,口腔糜烂流涎拒食2天,于1986年1月7日来诊。检查:软腭及两侧咽侧壁见有多数黄白色边缘不规则重叠小溃疡,直径2毫米左右,粘膜充血,白细胞总数4300/立方毫米,中性58%,咽拭涂片查细菌(-),培养(-),临床诊断为疱疹性咽峡炎。治疗:疱疹净冲剂4次/日,每次半包开水冲服,服药后24小时体温降至38.2℃,48小时降为36.8℃,疼痛显著减轻,已能进食,溃疡已大部愈合,第三天已完全愈合,进食如常。

三、体会:

1. 口腔病毒感染目前尚无特效药物,本冲剂具有明显阻止病情进展,减轻症状,促使溃疡愈合,缩短疗程的效果。

2. 本冲剂具有抗病毒、抗菌、镇静止痛退热等多种作用,曾试用病毒性感冒、病毒性腮腺炎、手足口病、病毒性结膜炎及扁桃体脓肿都取得显著疗效,无副作用,疗效确切。