

脑电图时未见咀嚼肌肌电干扰,解剖时动脉血呈暗红色,流速慢。生化测定见:寒体组大鼠腺苷激酶(ADK)活性,细胞能荷及肝脏钠—钾—ATP酶($\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATPase}$)活性比热体大鼠低, T_3 、 T_4 、孕酮和睾酮含量也比热体大鼠低。淋巴细胞体外增殖及DNA损伤后修复能力,热体比寒体高,常体大鼠居于两者之间。我们用热食与寒食分别喂常体大鼠,83天后杀死动物,发现常体动物的指标向寒体和热体两极分化。用热食喂寒体,寒食喂热体,83天后则见均向正体靠拢。

2.2 关于燥体与湿体的研究^[6]:我们用“五三粉”喂热体动物形成内燥,用猪油和蜂蜜喂寒体动物形成内湿,发现内燥组动物的血浆醛固酮、血清甲状腺素(T_4)、肝脏 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATPase}$ 均增高;内湿组的血浆醛固酮含量介于寒体组与常体组之间,血清 T_4 低于寒体组;肝脏 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATPase}$ 高于寒体组。内燥组舌苔丝状乳头角化过度,直肠粘膜杯状细胞内PAS阳性物质明显增多,肾上腺皮质球状带细胞浆较少,密集成堆;内湿组则见舌苔腻,直肠粘膜中杯状细胞内PAS阳性物质明显减少,肾上腺皮质呈“球状带细胞素状化”。超微结构观察见,内湿组肾小球上皮细胞足突变性融合。外周

淋巴细胞修复能力内湿组与内燥组均有不同程度的降低。

3 体质食疗学的前景

鉴于目前指导全人类饮食的主要理论是西方营养学,而营养学只研究了食物中七大营养要素的性能,关于食物中所谓“非营养要素”及其对人类生理、病理的作用尚知之甚少。我们已观察到饮食结构不符合他们的体质类型而引起的不良后果日益严重,我们呼吁人类必须绕开这一误区。近年我们提出了“体质食养是21世纪人类饮食结构改革的新方向”的观点,体质食疗研究的成果将使中医药学为人类作出较大的贡献。

4 参考文献

- 1 万建中. 饮食与中国文化. 南昌:江西高校出版社,1994.
- 2 匡调元. 调元·体质·食养. 上海科学技术文献出版社,1994.
- 3 匡调元. 体质食疗学. 上海科学技术出版社,1989.
- 4 匡调元. 中医体质病理学. 上海科学普及出版社,1996.
- 5 匡调元,等. 寒体与热体的研究. 中医杂志 1995;36(9):553.
- 6 匡调元,等. 内燥与内湿的实验研究. 中西医结合杂志特集,1995;15:281,284.

自拟扶正去原汤治疗弓形虫病 60 例

田 葱* 阮秀花* 张效本* 张喜梅* 任丽君*

1995年11月~1997年1月运用自拟扶正去原汤加减治疗弓形虫病60例,疗效满意,介绍如下。

1 临床资料

一般资料:本组60例中,男性36例;女性24例;年龄1~14岁38例,14岁以上22例,年龄最小2岁,最大50岁。所选病例均符合全国第二届全国弓形虫病学术讨论会制定的诊断标准。

临床表现:以中枢神经系统症状多见。其中头痛、头晕或伴呕吐者43例;口角抽动、挤眉弄眼8例;记忆力减退、学习能力差者5例;癫痫失神小发作者2例;发作性腹痛1例;单纯淋巴结肿大1例。

本组60例中,50例有猫、狗接触史,9例喜食羊肉串,1例为饭店厨师。

2 治疗方法

基本方:黄芪10~30g,青蒿10~20g,厚朴9~15g,苦参9~15g,生山楂10~20g。头痛者加细辛3g,川芎9g。头晕、癫痫者,加用熄风定痫药,如天麻、钩藤

9~15g等。口角抽动、挤眉弄眼者,加蝉蜕9~20g,地龙9~20g等。每日1剂,水煎服,1月为一疗程,疗程结束后进行血清学检查。

3 治疗结果

疗效判定按全国第二届弓形虫讨论会的标准。本组疗程最短半个月,最长3个月。60例中,治愈22例,占36.7%(症状体征消失,弓形虫血清学指标转阴,经半年至1年随访未复发者);显效23例,占38%(症状体征消失,弓形虫血清学指标部分转阴,经半年至1年随访无复发者);好转12例,占20%(症状体征部分改善,弓形虫血清学指标未阴转者);无效3例,占5%(症状体征未改善,血清学指标未阴转者)。总有效率95%。

4 讨论

弓形虫病为人畜共患性疾病,其临床表现复杂,但多以中枢神经系统症状为主。治疗上目前仍以磺胺嘧啶与乙胺嘧啶联用为主,虽有一定疗效,但常由于副反应而中断治疗,且停药后易复发。用中药治疗本病,具有疗效好、不易复发等优点。另外,从流行病学资料看,本病的发生与卫生条件差有关,因此,避免密切接触感染动物及污染的水源,切断弓形虫病的传播途径,对于预防本病有重要意义。

* 开封市医学科学研究所,河南省开封市丁角街(475000)

收稿日期:1997-07-10