

一。笔者效金氏之法,验证临床,用苍术 10~15g,加水武火煮沸 3 分钟,再文火缓煎 20 分钟,煎成药汁约 300ml,亦可用沸水浸泡,服时如喝香茗,少量频饮,不宜一饮尽杯,每日 1 剂,连服 3 个月为 1 疗程。自 1990 年以来,共治疗胃下垂 32 例,颇获良效。兹举验案如下。

如治:王某,女,36 岁。在当地县医院检查诊断为胃下垂已 2 年,给加兰他敏、苯丙酸诺龙肌注,中药口服,久治罔效。1992 年 9 月 8 日转来我院,邀余诊治。症见脘腹饱胀,食后加重,平卧减轻,嗝气或有呕吐,呕吐物为酸腐的食物残渣。大便干结,临厕努挣。体检:形体瘦长,面色萎黄。腹壁薄,上腹部可扪及较强烈的腹主动脉搏动,手指撞击腹部有振水音。舌质淡、苔薄,脉濡软无力。X 线胃肠钡餐检查:站立时胃呈无力型,位置下降,紧张力减退,形状狭长,下端膨大,下缘在髂嵴连线以下 5cm,排空迟缓,钡剂潴留。诊断为胃下垂。中医辨证属脾胃虚弱,中气下陷。药用单味苍术 15g,加水武火煮沸 3 分钟,再文火缓煎 20 分钟,煎取药汁 300ml,1 日

内细细频饮。同时配合:(1)少食多餐,少进汤水,保证每日摄入足够热量。(2)加强腹部肌肉锻炼,以增强腹肌张力。服药 40 天后复诊,脘腹饱胀好转,嗝气减少,呕吐已除。遂守是法巩固治疗 60 天,脘腹症状若失,大便通畅,面现荣润,体重增加 5kg。1992 年 12 月 20 日行 X 线胃肠钡餐复查:胃呈鱼钩型,紧张力中等,胃体垂直,胃角可见,下缘于髂嵴连线以上 2cm,钡餐 2 小时内胃即排空。临床治愈。继以补中益气丸善后,并嘱食养为本,坚持腹肌锻炼。随访 2 年,病未复发,体质转佳。

苍术味苦性偏温燥,辛香发散。外可祛风湿,内可燥脾湿。然其作用,不必拘于有湿才可应用之说,如苍术疗夜盲症、降血糖、治疟疾等,皆为辨病用药,发前人所未发。著名医家李杲早在《用药法象》中谓苍术为“治痿要药”。痿者,筋脉弛缓,软弱无力也。现代医学认为,胃下垂是胃支持韧带的松弛或胃壁的弛缓所致。它与中医学所说的脾胃虚弱,中气下陷,升举无力而成虚损的认识是一致的。

东莨菪碱治疗马钱子中毒

王 济 南*

我院于 1996 年 4 月 5 日收治两名误服马钱子中毒患儿,在使用安定等药物治疗效果不佳的情况下,改用东莨菪碱治疗收到良好效果。现介绍如下。

1 病例介绍

患者,男,6 岁,维族。患儿和其妹妹同时误服马钱子约 1g 左右,1 小时后发现,患儿已神志不清,全身抽搐,大小便失禁,急送我院急诊科抢救。经检查:体温 39℃,脉搏 135 次/分,呼吸 32 次/分,血压 16/12kPa,神志昏迷,压眶反射消失,瞳孔缩小,对光反射存在,牙关紧闭,口角流白沫,全身肌肉呈强直痉挛,角弓反张,呼吸困难,口唇发绀,心率速,律齐,无杂音,两肺呼吸音粗糙,无干湿性罗音,腹软,肝脾未触及,肠鸣音活跃。入院后即给予补液,维生素 C 等治疗,并反复使用

安定等镇静剂,症状不见缓解。即改用东莨菪碱,每次 0.3mg,加在 50% 的葡萄糖液 20ml 中静推,2 分钟后抽搐,角弓反张缓解,10 分钟后复用一次东莨菪碱,10 分钟后抽搐逐渐停止,15 分钟后再用一次东莨菪碱,患儿逐渐进入睡眠状态,呼吸平稳,于次日痊愈出院。

2 体会

马钱子为马钱科植物马钱的干燥成熟种子,苦寒有大毒,本品含有番木鳖碱和马钱子碱,番木鳖碱对中枢神经系统有兴奋作用,大量使用,能使脊髓反射兴奋显著亢进,引起特殊性强直性痉挛。常用量每次口服不得超过 0.1g。东莨菪碱可对抗番木鳖碱对中枢神经系统的兴奋作用,可选择性地抑制大脑皮层的兴奋性而又能兴奋呼吸中枢,并且对腺体的分泌有很强的抑制作用,而且还可解除骨骼肌、平滑肌痉挛,同时又可改善微循环,扩张毛细血管。所以,东莨菪碱治疗马钱子中毒是理想的药物,疗效肯定。

* 新疆生产建设兵团农一师医院,新疆阿克苏市团结路 15 号(843000)

收稿日期:1996-08-08