

显效 91 例(65.9%), 有效 32 例(23.2%), 无效 15 例(10.9%); 总有效率为 89.1%。对照组 44 例, 治疗后获显效 24 例(54.5%), 有效 15 例(34.1%), 无效 5 例(11.4%); 总有效率为 88.6%。两组患者的总有效率无显著差异($P>0.05$)。从附表看出, 两组疗效的分布均随病情的轻重程度不同而有显著差异(参附组 $P<0.001$, 对照组 $P<0.05$), 但两组相同程度病情间的疗效则无显著差异。

附表 两组疗效比较

病 情	参附组 (138例)			对照组 (44例)		
	显效	有效	无效	显效	有效	无效
轻 度	28	9	0	7	9	0
中 度	45	16	3	10	3	1
重 度	18	7	12	7	3	4
合 计	91	32	15	24	15	5

3. 两组疗效比较:

(1) 感染性休克疗效比较: 参附组感染性休克病例 55 例, 治疗后获显效 23 例(41.8%), 有效 25 例(45.5%), 无效 7 例(12.7%); 总有效率 87.3%。对照组 26 例, 治疗后获显效 11 例(42.3%), 有效 12 例(46.2%), 无效 3 例(11.5%); 总有效率 88.5%。两组总有效率无显著差异($P>0.05$)。

(2) 血压复常比较: 参附组在用药 1 小时内血压恢复正常者 59 例, 占该组总有效例的 48%; 对照组于用药 1 小时内血压恢复正常者 11 例, 占该组总有效例的 28.2%。参附组明

显优于对照组($P<0.05$)。

3. 主要观察指标变化: 治疗后, 对肢冷的改善参附组显著优于对照组($P<0.05$), 其它指标如神志、面色、体温、呼吸、心率、汗、尿的改善, 两组间无明显差异($P>0.05$)。

四、讨论

古验方参附汤主治正气大虚, 阳气暴脱, 上气喘急, 汗出如珠, 肢冷脉微者。经过对 138 例厥脱证患者的临床观察表明: 参附注射液治疗厥脱证的疗效和目前常用抗休克西药疗效相仿, 且未见任何毒副反应, 在血压回升及肢冷改善等方面明显优于对照组。故参附注射液是目前较理想的一种抗厥脱注射剂, 尤适于治疗阳气暴脱型厥脱证。

实验研究表明: 人参具有调节中枢神经功能, 增强心肌收缩力, 能提高机体的适应性, 增强抗病能力⁽¹⁾, 还能增强垂体—肾上腺皮质系统的功能。当机体受到不良刺激时, 能使垂体—肾上腺皮质系统功能免于衰竭⁽²⁾。附子具有明显的强心作用, 能改善外周和冠脉循环, 有抗炎、抗寒冷和提高对缺氧的耐受力⁽¹⁾等作用。由于人参和附子具有多方面的药理作用, 可见参附注射液在治疗厥脱证中所发挥的作用是较为全面和综合的。

参 考 文 献

- (1) 王保杰主编. 中草药药理学. 第一版. 北京: 人民卫生出版社, 1983: 46~73.
- (2) 王本祥. 人参药理学研究的新进展. 药学报 1980; 15: 313.

推拿手法治愈小儿肌性斜颈12例

宁夏银川市中医院按摩科 王 振

1981 年以来, 我用推拿手法治疗小儿肌性斜颈 12 例, 全部治愈, 现小结如下:

一、一般情况: 本组 12 例中, 男性 7 例, 女性 5 例。病程最长 2 个月, 最短 10 天。出生时属难产者 9 例, 顺产者 3 例。患儿发病部位均为右侧。

二、治疗方法: 取仰卧位, 在患侧乳突肌处交替使用按、揉、推法约 20 分钟, 并捏拿肿块数次; 于乳

突肌处自上而下施剥离手法数次; 医生右手扶住患侧肩部, 左手扶住患儿头顶, 同时用力使患儿头部渐渐向健侧肩部倾斜, 逐渐拔伸牵引患侧乳突肌, 反复进行数次。上述手法每日 1 次, 每次 30 分钟。使用手法时局部皮肤可涂些润滑剂如滑石粉、姜汁等。

三、治疗效果: 本组 12 例患儿治愈时间为 20 天~3 个月, 平均治愈时间为 2 个月。