

华东区1995年下半年高等中医自学考试 《西医内科学基础》试题

(答案下期刊出)

1 单项选择题(在备选答案中选出1个正确的答案,每小题0.5分,共25分)

1.1 稽留热常见于()

A. 败血症 B. 疟疾 C. 肺结核 D. 伤寒

1.2 意识障碍是指()

A. 病人睡眠状态,能回答问题,各种反射存在 B. 病人沉睡,对强刺激有反应 C. 对各种刺激无反应,尿便失禁 D. 人体对自身和周围环境的知觉及精神活动出现障碍

1.3 肺泡呼吸音增强,见于下列疾病()

A. 肺脓肿 B. 肺气肿 C. 肺水肿 D. 发热

1.4 右侧呼吸运动减弱,语颤增强,叩诊呈浊音,可闻及支气管呼吸音,湿罗音,语音传导增强,以上体征符合于()

A. 肺气肿 B. 大叶性肺炎 C. 支气管炎 D. 胸腔积液

1.5 二尖瓣狭窄时,以下哪项是错误的()

A. 心尖区舒张期杂音 B. 心尖区第一心音减弱 C. 心尖区内上方开放拍击音 D. 肺动脉瓣第二心音亢进

1.6 心界叩诊时,下面哪句话是错误的()

A. 先上后下 B. 由外向内 C. 用指指叩诊法 D. 相对浊音界代表心脏大小

1.7 有关腹痛各点,以下哪点是错的()

A. 持续性腹痛多由炎症所致 B. 痉挛性腹痛患者常拒按 C. 间隙性、阵发性腹痛常见于平滑肌痉挛 D. 个别心肌梗塞、心绞痛可出现腹痛

1.8 细菌性痢疾时大便呈()

A. 水样便 B. 脓血粘液便 C. 洗肉水样便 D. 米汤样便

1.9 哪项检查对门脉性肝硬化的诊断有意义()

A. 谷丙转氨酶 B. 胆红素 C. 血清白、球蛋白测定比值 D. 乙型肝炎抗原

1.10 测定肾小球病变的肾功能检查是()

A. 内生肌酐清除率试验 B. 昼夜尿比重试验 C. 酚红排泄试验 D. 二氧化碳结合力测定

1.11 膀胱结核的造影表现,下列哪项是正确的()

A. 膀胱正常大小,轮廓不整齐 B. 膀胱边缘有破坏 C. 膀胱有充盈缺损 D. 膀胱小而轮廓不整齐

1.12 溃疡型胃癌的下述X线征象中,哪项是不恰当的()

A. 龛影不整齐 B. 龛影位于轮廓外 C. 龛影四周有

不规则的透亮影 D. 胃壁僵硬

1.13 三度房室传导阻滞时,下列哪项是对的()

A. P-R间期 >0.22 秒 B. 心房率与心室率呈一定比例 C. 心室率 >50 次/分 D. P-P间期与R-R间期各有其规律性,心房率 $>$ 心室率

1.14 超声波诊断不适用于测定()

A. 肝脾大小 B. 脑肿瘤 C. 肺癌 D. 肝癌

1.15 肝占位性病变时用 ^{198}Au 作放射性核素检查时具有诊断价值的是()

A. 放射性核素均匀分布 B. 放射性核素分布浓集 C. 放射性核素分布不均匀 D. 放射性核素分布有稀疏缺损区

1.16 霍乱、副霍乱的主要治疗措施是()

A. 休息 B. 高热量饮食 C. 应用肾上腺皮质激素 D. 纠正水电解质紊乱

1.17 以往健康者,突然出现无其它原因的食欲不振、乏力和肝区不适,早期诊断最重要的是下列哪项检查()

A. 血清胆红素 B. 谷丙转氨酶 C. 胆碱酯酶 D. 甲种胎儿蛋白

1.18 流行性脑脊髓膜炎患者,脑脊液变化哪项是错误的()

A. 压力增高 B. 蛋白增加 C. 糖增加 D. 氯化物减少

1.19 支气管哮喘与心源性哮喘一时难以鉴别时,选下列哪种药物较恰当()

A. 肾上腺素 B. 西地兰 C. 氨茶碱 D. 吗啡

1.20 肺癌最常见的首发临床表现为哪项()

A. 吞咽困难 B. 声带麻痹 C. 阵发性刺激性咳嗽 D. 胸腔积液

1.21 下列哪项不是风湿热诊断标准的主要症状()

A. 心肌炎 B. 多发性关节炎 C. 发热 D. 皮下结节

1.22 下列哪项不是甲状腺危象的临床表现()

A. 体温 39°C 以上 B. 脉率 >160 次/分 C. 皮肤干燥 D. 呕吐、腹泻

1.23 上消化道出血最常见的原因是()

A. 门脉高压引起食道及胃底静脉曲张破裂 B. 消化性溃疡 C. 胆道疾患 D. 急性糜烂性出血性胃炎

1.24 门脉性肝硬化在我国最常见的病因是()

A. 病毒性肝炎 B. 血吸虫病 C. 中毒性肝炎 D. 慢性酒精中毒

- 1.25 尿淀粉酶明显增高最常见于()
A. 急性胃肠炎 B. 急性胰腺炎 C. 急性胆囊炎 D. 胰腺癌
- 1.26 尿路感染常见途径为()
A. 上行性感染 B. 淋巴道感染 C. 血源性感染 D. 邻近组织感染的直接蔓延
- 1.27 骨髓象中原粒细胞或早幼粒细胞明显增多,并伴有形态改变见于()
A. 急性粒细胞性白血病 B. 慢性粒细胞性白血病 C. 感染 D. 再生障碍性贫血
- 1.28 原发性血小板减少性紫癜出血时首选疗法是()
A. 脾切除 B. 输新鲜血 C. 肾上腺皮质激素 D. 止血敏
- 1.29 胰岛素治疗糖尿病下列哪项不适宜()
A. 合并妊娠 B. 合并重度感染 C. 糖尿病酮症酸中毒昏迷 D. 仅饮食不能控制的成人患者
- 1.30 使用阿托品抢救有机磷中毒,其有效依据为()
A. 颜面潮红 B. 心率增快 C. 瞳孔较前增大 D. 以上都是
- 1.31 瞳孔扩大见于()
A. 阿托品中毒 B. 吗啡中毒 C. 巴比妥中毒 D. 有机磷中毒
- 1.32 可使心尖搏动增强,范围扩大的疾病是()
A. 左侧胸水 B. 心包积液 C. 肺气肿 D. 左心室大
- 1.33 莫菲氏征阳性见于()
A. 急性胰腺炎 B. 急性胆囊炎 C. 急性阑尾炎 D. 胃穿孔
- 1.34 以下哪一种大便见于肠道下段出血()
A. 柏油样便 B. 鲜血便 C. 褐色球形便 D. 绿色稀便
- 1.35 肉眼血尿见于()
A. 肾或输尿管结石 B. 肾病综合征 C. 慢性肾炎 D. 心功能不全
- 1.36 胃酸明显增高见于()
A. 十二指肠溃疡 B. 胃癌 C. 萎缩性胃炎 D. 胃溃疡
- 1.37 弛张热是指()
A. 体温在 39℃ 以上,一天内温差在 2℃ 以上 B. 体温在 40℃ 以上,一天内温差在 2℃ 以上 C. 体温在 39℃ ~ 40℃ 之间,一天内温差在 1℃ 以上 D. 体温在 40℃ 以上,一天内温差在 1℃ 以上
- 1.38 心浊音界呈靴形扩大见于()
A. 右室大 B. 左室大 C. 左房大 D. 右房大
- 1.39 第二心音的听诊特点是()
A. 心音低、强、长 B. 心尖部最强 C. 与颈动脉搏动同时出现 D. 于心尖搏动稍后出现
- 1.40 正常心电图 P 波宽度应()
A. <0.08 秒 B. <0.11 秒 C. <0.14 秒 D. <0.20 秒
- 1.41 心电图 R-R 间距时间平均为 0.8 秒,心室率应为()
A. 65 次/分 B. 75 次/分 C. 85 次/分 D. 95 次/分
- 1.42 玫瑰疹对何种病诊断有价值()
A. 斑疹伤寒 B. 伤寒或副伤寒 C. 麻疹 D. 猩红热
- 1.43 突然寒战、高热、胸痛、咳嗽,咯铁锈色痰首先考虑的诊断为()
A. 金黄色葡萄球菌肺炎 B. 肺炎双球菌肺炎 C. 肺结核 D. 慢支急性发作
- 1.44 右心衰竭时应无()
A. 肝大压痛 B. 下肢水肿 C. 颈静脉怒张 D. 脾脏肿大
- 1.45 可提示坏死性胰腺炎的是()
A. 脐部出现瘀斑 B. 血钙增高 C. 血清淀粉酶升高 D. 血清脂肪酶升高
- 1.46 白细胞总数和嗜酸粒细胞百分比都增高见于()
A. 伤寒 B. 细菌性痢疾 C. 急性血吸虫病 D. 流行性脑脊髓膜炎
- 1.47 我国统计高血压病的常见死因是()
A. 慢性心功能不全 B. 急性脑血管疾病 C. 急性心肌梗塞 D. 慢性肾功能不全
- 1.48 心衰治疗措施中,不能减轻心脏负荷的是()
A. 休息 B. 限制钠盐 C. 利尿剂 D. 西地兰
- 1.49 急性白血病的血象主要表现为()
A. 白细胞总数增多 B. 有原始及早幼白细胞 C. 全血细胞减少 D. 血小板减少
- 1.50 成年人肺结核最常见的类型是()
A. 原发型肺结核 B. 血行播散型肺结核 C. 慢性纤维空洞型肺结核 D. 浸润型肺结核
- 2 多项选择题(在备选答案中选出 2~5 个正确答案,每小题 1 分,共 25 分)
- 2.1 咯血可见于下列疾病()
A. 二尖瓣狭窄 B. 胸膜炎 C. 肺水肿 D. 支气管扩张 E. 肺结核
- 2.2 长期服用下列哪些药物会引起上消化道出血()
A. 强的松 B. 庆大霉素 C. 消炎痛 D. 保太松 E. 氢氧化铝
- 2.3 阻塞性黄疸的实验室检查有哪些变化()
A. 黄疸指数增高 B. 大便为白陶土样 C. 尿中胆红素阴性 D. 尿中胆红素原增加(T: 20 阳性) E. 一分

钟胆红素明显增高

2.4 产生心脏杂音的因素有()

A. 血流加速 B. 瓣膜口狭窄 C. 瓣膜关闭不全 D. 心及血管异常通道 E. 心腔内漂浮赘状物

2.5 流行性脑脊髓膜炎有哪些特征()

A. 急起高热 B. 头痛呕吐 C. 皮肤瘀点 D. 颈强直、克尼格征阳性 E. 出现截瘫或偏瘫

2.6 再生障碍性贫血的临床表现为()

A. 贫血 B. 出血 C. 感染 D. 肝脾肿大 E. 胸骨压痛

2.7 现病史主要内容包括()

A. 起病情况 B. 主要症状的特点 C. 伴随症状 D. 病情演变 E. 诊疗经过

2.8 蜘蛛痣可见于()

A. 健康妇女妊娠期 B. 急性肝炎 C. 慢性肝炎 D. 转移性肝癌 E. 肝硬化

2.9 常可出现哮鸣音的肺疾患是()

A. 支气管哮喘 B. 肺结核 C. 肺癌 D. 慢支喘息型 E. 肺炎球菌肺炎

2.10 门脉高压的体征有()

A. 腹水 B. 脾大 C. 食道胃底静脉曲张 D. 黄疸 E. 腹壁静脉曲张

2.11 可引起血浆尿素氮增高的疾病有()

A. 肾功能减退 B. 上消化道大出血 C. 尿崩症 D. 急性肾盂肾炎 E. 肾前或肾后因素致少尿或无尿

2.12 心电图QRS波增宽可见于()

A. 左、右心室扩大 B. 左、右房扩大 C. 房室传导阻滞 D. 多源性室性早搏 E. 心房颤动

2.13 慢支并发症有()

A. 阻塞性肺气肿 B. 肺原性心脏病 C. 支气管扩张 D. 肺结核 E. 肺水肿

2.14 洋地黄中毒表现主要有()

A. 泌尿系症状 B. 消化道症状 C. 神经症状 D. 黄视、绿视 E. 心律失常

2.15 胸壁疾患引起的胸痛特点是()

A. 痛的部位不固定 B. 局部常有压痛 C. 深呼吸、咳嗽不致引起胸痛加剧 D. 肋软骨炎常累及第2~4肋软骨 E. 带状疱疹沿肋间神经分布

2.16 支气管呼吸音正常听诊部位在()

A. 胸骨角附近 B. 喉部 C. 背部的肩胛区 D. 胸骨上窝 E. 背部第6颈椎到第2胸椎附近

2.17 心尖部第一心音减弱见于()

A. 二尖瓣狭窄 B. 二尖瓣关闭不全 C. 主动脉瓣狭窄 D. 主动脉瓣关闭不全 E. 心肌梗塞

2.18 肝硬化常见的并发症有()

A. 急性上消化道出血 B. 肝性昏迷 C. 原发性肝癌

D. 感染 E. 肝肾综合征

2.19 慢性肾炎产生水肿的主要原因为()

A. 全身毛细血管通透性增高 B. 肾小球—肾小管功能失衡 C. 肾小球滤过率降低 D. 低蛋白血症 E. 继发性醛固酮增多

2.20 脑出血的常见表现是()

A. 突然起病,症状在数分钟至数小时达到高峰 B. 可有剧烈头痛、呕吐 C. 血压增高,脉搏缓慢有力 D. 偏瘫 E. 多有短暂脑缺血发作前驱症状

2.21 左心室肥大的心电图特征为()

A. $RV_5 > 2.5mV$ B. $RV_5 + SV_1 > 4.0mV$ C. 电轴左偏 D. QRS波时间 < 0.06 秒 E. ST-T改变

2.22 重症肝炎的治疗原则包括()

A. 高蛋白、高热量饮食 B. 短期应用氢化可的松 C. 纠正出血倾向酌情给予维生素K D. 颅内压增高时,给予甘露醇 E. 换血疗法

2.23 符合慢性支气管炎诊断条件的有()

A. 反复发作的咳嗽、咯痰或喘息 B. 每年患病至少3个月,并连续两年以上 C. 时有大量咯痰、咯血 D. 与长期吸烟有关 E. 需排除伴有咳、痰、喘的其它心、肺疾病

2.24 内源性哮喘的特点包括()

A. 多见于青壮年 B. 常于春、秋季发病 C. 较多见哮喘持续状态 D. 有鼻痒、喷嚏、咳嗽及胸闷前驱症状 E. 症状缓解后两肺哮鸣音及湿罗音可持续多时

2.25 急性中毒的治疗原则包括()

A. 终止接触毒物 B. 消除未被吸收的毒物 C. 促进已吸收毒物排出 D. 拮抗剂与解毒剂 E. 对症治疗

3 名词解释(每小题2分,共4分)

3.1 开瓣音(包括临床意义)

3.2 大便隐血试验(包括临床意义)

4 填空题(每空0.5分,共18分)

4.1 请填入下列各项成年男性的正常值(包括单位)

A. 血红蛋白() B. 红细胞计数() C. 白细胞计数() D. 白细胞分类中嗜中性粒细胞(分叶核)占()% E. 红细胞沉降率() F. 收缩压() G. 舒张压()

4.2 主诉的定义是()。

4.3 每昼夜尿量超过()ml时称为多尿,少于()ml时称为少尿,尿量少于()ml时,称为尿闭或无尿。

4.4 急性心肌梗塞特征性的心电图图形A. ()

B. () C. ()。

4.5 风湿性心瓣膜病的并发症有A. () B. () C. () D. () E. ()。

4.6 常用抗心绞痛治疗的药物有()和()两

大类,此外还有钙运转阻滞剂等。

- 4.7 伤寒的常见而又重要并发症是()和()。
- 4.8 我国血吸虫病是由日本血吸虫寄生于()内所引起的寄生虫传染病,()是唯一的中间宿主。
- 4.9 根据病理,慢性胃炎可分成(),()和肥厚性胃炎三类。
- 4.10 腹水治疗:A.() B.() C.()和腹腔放液及其他。
- 4.11 目前糖尿病的主要并发症和死因是()。
- 4.12 在急性脑血管疾病中,脑膜刺激征最常见于(),起病最快的是(),常在安静时发病,症状逐渐加重的是(),脑脊液血性常见于()和()。

5 论述题(每小题 5 分,共 20 分)

- 5.1 器质性与功能性收缩期杂音如何鉴别?(请列表说明)
- 5.2 休克型肺炎应如何治疗?
- 5.3 慢性肾炎类肾病型的诊断及治疗。

华东区 1995 年下半年高等中医自学考试

《中药学》试题答案及评分标准

1 填空题(每空 0.5 分,共 30 分)

1. 苦 软坚散结 泻下 2. 生黄芩 炒制品 酒芩 炒成炭用 3. 1.5~3 0.3~0.9 4. 布包 后下 冲服 5. 祛风湿 解除痹痛 6. 行气止痛 降逆调中 温肾纳气 7. 宁心安神 祛痰开窍 消痈肿 8. 敛肺平喘 收涩止带 9. 补气升阳 益卫固表 托毒生肌 利水退肿 10. 解毒 杀虫 11. 活血止痛 化瘀止血 12. 祛风湿 止痛 解表 13. 槟榔 鹤草芽 榧子 14. 麦门冬 沙参 石斛 玉竹 15. 止泻 清肝明目 清肺化痰 16. 麻黄 香薷 浮萍 17. 解毒透疹 疏散风热 利咽散肿 凉血活血 18. 怀胎蕴热 胎动不安 胎漏下血 19. 湿痰 寒饮 20. 补肝肾 行血脉 补而不滞 21. 寒凉 血热瘀滞

2 单项选择题(每小题 0.5 分,共 10 分)

1. ② 2. ① 3. ② 4. ② 5. ② 6. ② 7. ③ 8. ③
9. ③ 10. ② 11. ② 12. ③ 13. ④ 14. ② 15.
① 16. ② 17. ④ 18. ① 19. ③ 20. ②

3 多项选择题(每小题 1 分,共 10 分)

1. ④⑤ 2. ①② 3. ③④ 4. ①③ 5. ②④ 6. ③④
7. ①④ 8. ①③ 9. ①③ 10. ①③

4 多项选择题(每小题 1 分,共 10 分)

1. ①②④⑤ 2. ①③⑤ 3. ①③⑤ 4. ①②③④ 5.
①③④⑤ 6. ①②④⑤ 7. ①②③④⑤ 8. ①②③④
⑤ 9. ①③⑤ 10. ①②③④⑤

5 简答题(每小题 5 分,共 20 分)

1. 概念:凡以收敛固涩为主要作用的药物,称为收涩

药。适应证:用于久病体虚、正气不固所致的自汗、盗汗、久泻、久痢、遗精、滑精、遗尿、尿频、久咳虚喘,以及崩带不止等滑脱不禁的证候。禁忌:收涩药有敛邪之弊,故凡表邪未解,或内有湿滞,以及郁热未清,均不宜用。

6 病例分析(8 分)

男性,64 岁,农民,慢性咳嗽 20 年,气喘 6 年,近 1 月来咳嗽气急加重,伴下肢浮肿,发热 3 天,神志恍惚 1 天,来院急诊。体检:体温 38.5℃,脉率 124 次/分,呼吸 30 次/分,血压 18/10kPa (135/75mmHg),嗜睡,半卧位,呼吸急促,唇甲紫绀,瞳孔等大等圆,颈静脉怒张,桶胸,两肺呼吸音低,有散在性干、湿罗音,心尖搏动剑突下最明显,心率 120 次/分,律齐,肝颈回流阳性,肝肋下 2 指,双下肢凹陷性水肿,病理反射未引出。实验室检查:红细胞 $5.2 \times 10^{12}/L$ (520 万/mm³),血红蛋白 150g/L (15g/dl),白细胞 $12.0 \times 10^9/L$ (12000/mm³),嗜中性粒细胞 88%。尿常规及肝功能正常。血气分析:氧分压 6.0kPa (45mmHg),二氧化碳分压 10kPa (75mmHg)。根据上述情况回答下列问题:(1)完整诊断;(2)治疗原则。

药。适应证:用于久病体虚、正气不固所致的自汗、盗汗、久泻、久痢、遗精、滑精、遗尿、尿频、久咳虚喘,以及崩带不止等滑脱不禁的证候。禁忌:收涩药有敛邪之弊,故凡表邪未解,或内有湿滞,以及郁热未清,均不宜用。

2. 用于外感风寒,头痛、鼻塞。用于阳明经头痛,眉棱骨痛,头风痛,齿痛。用于疮疡肿痛。用于寒湿带下。

3. 适应证:用于间日疟、三日疟及热毒血痢、里急后重等证。用量用法:治疟疾每次 10~15 粒,治病 10~30 粒,不宜入汤剂,可装胶囊或桂圆肉包裹吞服。使用注意事项:对胃肠道及肝肾均有损害,不宜多用久服。胃肠出血及肝肾病患者,应忌用或慎用。

4. ①相同点:均能化湿、行气、温中。不同点:砂仁又能安胎;白豆蔻又能止呕。②相同点:均能止血。不同点:贯众长于凉血止血,又能杀虫、清热解毒;艾叶长于温经止血,又能散寒止痛。

6 论述题(每小题 10 分,共 20 分)

1. 药物毒性是药物性能之一。认识各种药物的有无毒性及毒性之强弱,在医疗上有时可以采用“以毒攻毒”的法则,如应用适宜的毒药来解疮毒、除毒疔、杀虫……等。同时,认识各种药物的有毒、无毒、大毒、小毒,可以帮助我们理解其作用之峻利或和缓,临床上可根据病体虚实、疾病深浅等适当地选用药物和确定用量,并可通过必要的炮制、配伍、制剂等环节来减轻或消除其有害作用,以保证用药安全。

2. 威灵仙:辛、咸、温。能祛风湿、通经络、止痹痛,其性