

专

题

笔

谈

白及内服外用均有较好的止血作用

中国中医研究院广安门医院(北京 100053)

谢海洲

白及止血是一种收敛作用,且能消肿生肌,过去多用于肺结核咯血,后逐渐推广应用于肺脓疡、支气管扩张之咳血,胃溃疡吐血或胃及十二指肠穿孔等症,肺结核空洞尤为适宜。白及能增强机体防卫能力,抑制葡萄球菌和链球菌的生长,局部涂抹可形成保护膜。

内服外用均有较好的局部止血作用,可用于急救外敷出血部位或用灭菌白及粉喷雾于出血处,能迅速止血。如烧伤用此可防止外界细菌的侵入,杀灭创面残留细菌,促进烧伤皮肤组织的修复。

白及粉调膏敷治乳头皲裂效果好。妇产科术后出血宜用白及粉。其所含多量胶质粘液能促进创面肉芽生长和愈合,并能促使血细胞凝集,形成人工血栓,阻止血液外流,具有局部止血作用。也可与阿胶制成合剂,用于皮肤创伤的粘合剂。也可制成糊、粉。

我常用白及粉装胶囊吞服,用于胃肠道出血,认为其效力不亚于安络血、维生素K。但白及制粉比较困难,因此也影响了它的应用。

白及防治放射性食道炎

中日友好医院肿瘤科(北京 100029)

万冬桂 李佩文 蔡光荣

白及《神农本草经》云“主痛肿恶疮败疽,伤阴死肌,胃中邪气……”。《本草纲目》亦有“生肌治疮”的记载。笔者受其启发,用其防治放射性食道炎,取得满意效果。

放射性食道炎是食道及肺门、纵隔淋巴结区放射治疗过程中严重的并发症之一,以咽痛及吞咽困难为主要症状。中医认为放射性食道

炎属“噎膈”范畴,系由热毒(射线)伤阴,胃气不和,气机升降失调所致。白及味苦甘而涩,性凉。味甘能调和中气,味苦能降,使胃气调降。其含挥发油、粘液质等,根含白及甘露聚糖,白及粉或煎煮所得胶状液,粘合力强,服用后能保护食道粘膜,防止射线损伤,同时亦有良好的消肿生肌作用,促进局部炎性水肿或溃疡痊愈。临床应用时可单用白及粉3~6g冲服,或重用白及20~30g,配伍山豆根6~9g,银花15~30g,花粉15~30g等清热解毒、养阴润燥之品入汤剂,使热退毒去,津液自生,气机条达,故临床诸症自愈。

如治毕某,男,67岁。因进行性吞咽困难半年入院,经食道造影及食道镜检确诊为食道上段低分化鳞状细胞癌。因患者年高体弱,本人拒绝手术治疗,故而采用放疗,并同时配合以白及为主的上述汤药治疗,放射总量达7000rad/35次,过程顺利,未出现明显咽痛等放射性食道炎症状,放疗后吞咽困难明显减轻,复查钡餐示病灶基本消失。

又如任某,男,48岁。因右上肺鳞癌术后,右肺门及纵隔淋巴结转移而行肺门、纵隔区放疗,放疗1400rad/7次后即感咽痛甚,吞咽困难,被迫停止放疗,来我科要求服用中药治疗。查舌淡红、苔黄少津,脉细数。中医辨证为热毒伤阴,处以白及20g,花粉30g,银花15g,山豆根6g,芦根30g,水煎服,每日1剂。3天后症状缓解,继续放疗,同时配合上方加减,放疗顺利完成,总量为5500rad/28次,未再出现咽痛、吞咽困难等症。

白及善于止血愈合破损

黑龙江省齐齐哈尔市中医院(黑龙江 161000)

陈景河

白及性涩微寒,味甘辛微苦。前贤及近代医