

1 治疗各种咯血疗效佳。以白及、百合各 10g 水煎,阿胶 10g 化服,三七 1.5g 冲服,每日 1~2 剂,治疗各种疾病引起的咯血共 14 例,其中支气管扩张症咯血 5 例,肺结核咯血 4 例,倒经咯血 3 例,肺癌咯血 2 例,均于服药 5 天内咯血停止,继续服药 1~3 月以巩固疗效。半年后随访,除肺癌咯血复发 1 例,死亡 1 例外,其余均未复发。

2 与雷米封合用治疗肺结核。患者 5 例,均诉咳嗽、午后低热,夜间盗汗伴消瘦,经 X 线胸片诊断为浸润型肺结核。曾用链霉素、雷米封、利福平三联抗痨药治疗 1~2 周,因出现链霉素、利福平毒性反应而停用。后予以白及研粉 9g/日,分 3 次服,雷米封 0.3g/日,顿服。连服 3 个月,症状消失,继服 6 个月,复查胸片,其中 2 例肺部阴影吸收好转,呈纤维索条影。另 3 例呈硬结,部分钙化。

例如,患者李某,女,53 岁,主因咳嗽、咯痰伴发热 2 周,体温 37.5~38℃,经 X 线胸片发现左上浸润型肺结核,给予链霉素、雷米封、利福平治疗,2 周后自觉耳鸣、耳聋、眩晕,时有恶心、纳差,经耳鼻喉科会诊考虑为链霉素毒性反应;化验肝功能,转氨酶 164U/L,考虑为利福平所致肝损害,随停用链霉素、利福平,改为白及粉 9g/日,分 3 次服,雷米封 0.3g/日,顿服,服药 2 个月,咳减,体温正常,继服 6 个月症状消失,复查胸片仅留左上纤维索条影,肝功能正常。

3 治疗百日咳有奇效。百日咳为 5 岁以下小儿常见呼吸道传染病,病程长,抗生素疗效差。笔者用白及、蜈蚣、甘草等分,为细末,每服 2g,2~3 次/日,蜜水调服,连服 1~2 周痉咳缓解后再以白及、甘草等分为末,每日服 2g,继服 2~3 周,巩固疗效。共治疗 20 例,服药 1 周痉咳缓解者 8 例,服药 2 周痉咳缓解者 12 例。

例如,患者吴某,男,4 岁,主因阵发性咳嗽 2 周就医,曾在院外服头孢氨苄、头孢拉定,肌注链霉素等无效,且逐渐呈痉挛性咳嗽,伴高调吼声,每天发作 10 余次,夜间为重,影响睡眠,诊为百日咳。按上法给予白及、蜈蚣、甘草连服

2 周,咳减,继服 2 周而痊愈。

白及为止咳良药

广东省新兴县人民医院(广东 527400)

黄 新 华

笔者早年随师姚景南先生(肇庆市名老中医),见师常于难治性咳嗽病例中加入白及 10~20g,其效极佳,甚觉惊奇。诊余查阅本草方书均无所获,请教于师,师言:“白及味苦甘而性凉,颜色白而入肺,前人均谓其能收敛止血,消肿生肌,其实白及又善止咳,尤对阴虚咳嗽、肺热咳嗽、百日咳、癆咳有良效,惟其味涩,故有表证者慎用。”笔者恍然大悟,知此为吾师独有心得。遂于日后诊务中,随证加入白及,共治疗 103 例,屡用屡验,若将白及研末冲服其效更佳。

笔者曾治一小儿,男,6 岁,2 个月前开始剧烈咳嗽,中西药物治疗均未能取效,作过多种检查亦未见异常。诊时见形体消瘦,面色潮红,咳嗽无痰,手足心热,夜卧不安,烦躁盗汗,舌红苔薄黄,脉细数无力。诊为肺阴亏虚,方用:麦冬 8g,天冬 8g,沙参 8g,地骨皮 10g,白芍 10g,石斛 8g,龙利叶 5g,枇杷叶 8g。2 剂后诸证均减,惟咳嗽依旧,遂于原方中加白及 8g,研末分 2 次冲服,服后咳嗽大减,再续 2 剂而愈。

白及用于血管瘤

湖南省溆浦县人民医院(湖南 419300)

周 高 龙

笔者在近年临床实践中,应用大剂量白及外敷治疗血管瘤,获得较满意的疗效,现介绍如下。

白及性涩而收为止血良药,且可泄血热,又有消肿生肌之效,如验方独圣散,单用为末糯米汤调服,治吐血、咯血、鼻衄。又如《济急方》以之同煅石膏为末,敷治刀伤;又手足皸裂,用白及末水调涂之,可以愈合。白及止血作用较强,应用大剂量白及,配伍消肿散结,行气化瘀的药物,共研细末加水、醋、酒适量调成糊状外敷治疗血管瘤,效果显著。如河南一男性患者,郭某,