

- 4.8 银翘散可用于治疗下列哪些病证()
A. 肺病初期 B. 风热犯肺的咳嗽 C. 热哮 D. 耳鸣耳聋 E. 肺热壅盛的癰闭
- 4.9 瘀血停着的胁痛,可选用下列哪些方剂()
A. 旋覆花汤 B. 丹参饮 C. 复元活血汤 D. 失笑散 E. 调营敛肝饮
- 4.10 热秘的治疗,宜选用下列哪些方剂()
A. 更衣丸 B. 麻子仁丸 C. 济川煎 D. 《尊生》润肠丸 E. 温脾汤
- 5 多项选择题(在备选答案中选出2~5个正确答案。每小题1分,共10分)
- 5.1 龙胆泻肝汤可用于治疗下列病证()
A. 耳鸣耳聋 B. 吐血 C. 癰闭 D. 不寐 E. 遗精
- 5.2 治疗脓痰腥臭,可选用下列哪些药物()
A. 鱼腥草 B. 野荞麦根 C. 鲜薏苡根 D. 陈芥菜卤 E. 桔梗
- 5.3 治疗霍乱的中成药有()
A. 纯阳正气丸 B. 辟瘟丹 C. 来复丹 D. 紫雪丹 E. 行军散
- 5.4 湿热下注导致的遗精可选用下列方剂()
A. 程氏萆薢分清饮 B. 苍白二陈汤 C. 猪肚丸 D. 龙胆泻肝汤 E. 封髓丹
- 5.5 风寒湿痹可选用下列哪些方剂()
A. 防风汤 B. 薏苡仁汤 C. 宣痹汤 D. 蠲痹汤 E. 乌头汤
- 5.6 消渴的并发症有()
A. 肺癆 B. 雀目 C. 白内障 D. 水肿 E. 耳聋
- 5.7 肺胀的临床表现有()
A. 胸部膨满 B. 喘咳上气 C. 烦躁 D. 肢体浮肿 E. 面色晦暗
- 5.8 呃逆的发生,除由于胃气上逆外,尚与下列诸脏有关()

- A. 心 B. 肝 C. 肺 D. 脾 E. 肾
- 5.9 水肿的治疗方法,除发汗、利尿、攻逐之外,尚有()
A. 健脾 B. 温肾 C. 和胃 D. 降浊 E. 化痰
- 5.10 厥证的病机主要是由于()
A. 气机逆乱 B. 升降乖异 C. 清浊相干 D. 阴阳离决 E. 气血运行失常
- 6 简答题(每小题5分,共20分)
- 6.1 简述消渴并发疮疖、痈疽的病机。
- 6.2 简述阴虚胃痛的主症、治法和主方。
- 6.3 《金匱要略》对水肿如何分类?该书提出水肿的治疗原则是什么?
- 6.4 中风的病机可归纳为哪六端?其中以什么为根本?
- 7 论述题(8分)
如何理解“治痿独取阳明”,请谈谈你的看法。
- 8 医案分析(8分)
邓某,男,59岁。左胸疼痛阵作,痛时向左肩臂放射,感寒痛甚,胸闷气短,夜半每欲临窗呼吸方舒,苔白腻,脉沉细涩。处方:全瓜蒌10g,薤白头5g,川桂枝5g,制半夏10g,紫丹参15g,大砂仁3g(研后人),白檀香5g,白酒30g(冲),枳实10g。
- 根据上述医案,请回答下列问题:
- (1)本案的中医诊断为()。
- (2)本案的主要病机是()、()、()。
- (3)本案的处方包含瓜蒌薤白白酒汤、()、枳实薤白桂枝汤和()4张方剂。
- (4)本案若证转心痛彻背、背痛彻心,痛剧而无休止,身寒肢冷,喘息不得卧,脉转沉紧,宜改用()和苏合香丸,以芳香温通而止痛。
- (5)本案若兼见汗出肢冷,面色苍白,唇甲青紫,舌转淡白,脉转沉细无力,治宜()法,方用()汤。

山东省1996年上半年高等中医自学考试

《正常人体解剖学》试题答案及评分标准

1 填空题(每空0.5分,共20分)

1. 椎间盘、黄韧带 2. 尺骨鹰嘴、肱骨内上髁、肱骨外上髁 3. 腱划、腹横筋膜 4. 颈静脉孔 5. 左右肋弓最低点、左右髂前上棘之间 6. 颞弓、上颌第二磨牙 7. 直肠横襞 8. 膈穹窿、第5肋 9. 咽喉喉部、甲状腺左右叶 10. 中部、上部 11. 子宫圆韧带、骶子宫韧带 12. 右心房、左心室 13. 回结肠动脉、阑尾系膜 14. 足背静脉弓内侧、前方 15. 颈内静脉、颈干 16. 节细胞、鼻、视神经盘 17. 椭圆囊斑及球囊斑、壶腹嵴 18. 颞横回、每侧听觉中枢都接受两耳的听觉冲动

19. 颈神经1~4、胸锁乳突肌、胸锁乳突肌后缘中点

2 单项选择题(每小题1分,共15分)

1. D 2. B 3. B 4. C 5. A 6. D 7. C 8. C 9. A 10. C 11. A 12. D 13. B 14. C 15. B

3 多项选择题(每小题1分,共15分)

1. ACDE 2. ABD 3. BCD 4. ACD 5. CD 6. ACE 7. BDE 8. ABC 9. BE 10. BCE 11. ADE 12. ABCE 13. ABE 14. ABC 15. BCDE

4 改错题(每小题1分,共10分)

1. 锁骨应为胸骨柄上缘 2. 外应为内;小结节嵴应为

大结节下方的骨嵴 3. 一应为二; 2、3 腰椎应为 1、2 腰椎 4. 小肠应为盆腔侧壁 5. 含氧量较高应为出心 6. 右应为左 7. 全部 12 对应为后 10 对 8. 三大分支都应为下颌神经 9. 大腿内侧面应为足内侧缘 10. 后应为前; 运动应为混合性

5 名词解释(每小题 2 分, 共 14 分)

1. 胸骨角: 胸骨体与胸骨柄相接处形成突向前方的横行隆起, 称胸骨角; 它平对第 2 肋, 为计数肋的重要标志。
2. 联合腱: 腹内斜肌腱膜之下内侧部与腹横肌腱膜形成联合腱, 止于耻骨, 又称腹股沟镰, 参与构成腹股沟管之后壁。
3. 小网膜: 由肝门至胃小弯和十二指肠上部之间的双层腹膜构成, 可分为两部: 左侧部分称肝胃韧带, 右侧部分称为肝十二指肠韧带。
4. 弹性圆锥: 为近似圆锥形的弹性纤维膜, 其下缘附着于环状软骨上缘, 而上缘游离并紧张于甲状软骨前角后面与杓状软骨基部之间, 又称声韧带。
5. 右淋巴导管: 为一短干, 长约 1.5cm, 由右颈干、右锁骨下干和右支气管纵隔干汇合而成, 注入右静脉角, 收集人体右上 1/4 部的淋巴液。
6. 白交通支: 白交通支是脊髓侧角细胞发出的节前纤维离开脊神经进入交感干神经节的通路, 只见于第 1 胸~第 3 腰神经与相应交感干神经节之间, 因有髓鞘, 呈白色。
7. 硬脑膜窦: 硬脑膜内、外两层分离处, 内衬一层内皮细胞, 构成流通静脉血的硬脑膜窦。包括上矢状窦, 横窦, 乙状窦及海绵窦等, 收集颅内静脉血经颈静脉孔流入颈内静脉。

6 问答题(共 26 分)

1. 膝关节由股骨内、外侧髁, 胫骨内、外侧髁, 髌骨构成。

膝关节特点是: 关节囊内滑膜层向关节腔内突入而形成翼状襞, 关节囊前壁不完整, 由髌骨及髌韧带填

补, 关节囊广阔、松弛, 囊两侧有副韧带加强, 囊内有内外侧半月板, 前、后交叉韧带固定。

膝关节在额状轴作屈、伸运动, 在屈膝状态下, 可作旋内、外运动。

2. 胃充满到中等程度时, 约 3/4 位于左季肋区, 1/4 位于腹上区, 其贲门约在第 11 胸椎之左侧, 幽门约在第 1 腰椎之右侧。

胃有两口(贲门、幽门), 两壁(胃前、后壁), 两缘(胃大、小弯)。

胃分为三部分, 即胃底部, 胃体部, 幽门部(幽门管、幽门窦)。

3. 门静脉由肠系膜上静脉和脾静脉汇合而成, 长约 6~8cm, 向右上斜行, 进入肝十二指肠韧带内, 门静脉的五大属支, 门静脉与上、下腔静脉间的吻合部位主要有胃左静脉, 附脐静脉与脐周静脉网, 直肠上静脉与直肠下静脉、肛门静脉。

4. 面神经包含: 躯体运动纤维, 内脏运动纤维, 内脏感觉纤维。

面神经: 躯体运动纤维——面神经核, 内脏运动纤维——上泌涎核, 内脏感觉纤维——孤束核。

面神经进出: 脑——延髓脑桥沟, 颅——茎乳孔。

面神经支配: 面部表情肌运动, 泪腺、颌下腺、舌下腺分泌, 舌前 2/3 味觉。

5. 支配虹膜: 交感神经低级中枢——脊髓胸 1~2 侧角, 副交感神经低级中枢——动眼神经副核。

心: 交感神经低级中枢——脊髓胸 1~4 侧角, 副交感神经低级中枢——迷走神经背核。

胃: 交感神经低级中枢——脊髓胸 5~12 侧角, 副交感神经低级中枢——迷走神经背核。

子宫: 交感神经低级中枢——脊髓腰 1~3 侧角, 副交感神经低级中枢——脊髓骶 2~4 副交感神经细胞。

交感神经可使瞳孔开大、心跳加快、支气管平滑肌舒张、消化管蠕动减弱。

本刊征稿启事

自从“专题笔谈”栏刊登临床用药经验以来, 受到了广大读者的欢迎与好评。为继续办好本刊, 欢迎广大作者、读者踊跃投稿。现预征 1998 年稿件, 具体药名如下: 白芥子、黄精、仙灵脾、羌活、葛根、夏枯草、半枝莲、茜草、滑石、代赭石。

以上药物请任选某味介绍, 要有别于教科书, 确为家传师授或个人在临床实践中积累的经验, 老药新用, 发前人所未发, 重点介绍个人独到的心得和体会。

要求每药篇幅限于字以内, 各药独立成篇, 以便于

分检归类。稿件择优录用, 恕不退稿。来稿请于 1997 年 9 月 31 日前寄至本刊编辑部。

本刊对未录用稿件均不发回执。

提供空心胶囊

产品型号(胃溶)0# 装量 0.3g~0.5g; 1# 装量 0.1g~0.3g; 2# 装量 0.1g 以下。

价格: 135 元/万粒(含邮资)。

需要者请汇款至浙江新昌越州制药有限公司 潘炎锋收, 邮编: 312560, 电话: (0575)6060338, 9086676。款到三日内发货, 如有质量问题及数量不足厂方负责。请写清收货地址。

(广告编号: 9707-13)