

胶、水陆二仙胶等滋而补虚，润而泽脏，胶而碍滞之性有别。因此，在应用“葶膏”时，必须注意三点：一是掌握调补与病邪的关系，即攻三补七，还是补三攻七，过用滋腻反而达不到调补的目的；二是葶膏初宜量少，或逐年添增，使机体对胶滋药有一适应过程；三是应与疏调气机的药物同用。总之，膏方的调补，以不妨碍祛除病邪，协调脏腑的作用为要。

例三：周××，女，59岁。

肺脾素虚，气阴两亏，兼见痰热内阻，胃气不和，络脉痹滞，营血不周，症见咳嗽痰黄，腕部胀满，神疲乏力，口干少饮，纳谷呆滞，气短，左肩臂痠楚，脉细滑，舌苔边腻中少、有裂纹，时届封藏，法当调理。

南北沙参各30克，炒党参30克，天麦冬各30克，炙百部60克，川贝母30克，水炙桑皮60克，炒生地30克，甜杏仁60克，水炙款冬60克，水炙甘草15克，旋覆花(包)30克，海浮石60克，炒山药60克，炒桑枝60克，秦艽60克，独活60克，制半夏30克，炒

陈皮30克，炙远志15克，炒川断60克，桑寄生60克，川石斛60克，枸杞子60克，炒归身30克，赤白芍各30克，制首乌60克，炒黄芩30克，香扁豆60克，香谷芽60克，炒神曲30克，佛手片15克，生牡蛎(先煎)60克。

上药先浸一宿，武火煎三次，去渣沥清，文火收膏时，加入桑枝膏150克，枇杷叶膏90克，白冰糖240克，熬至滴水成珠为度。每日晨晚各服一汤匙，温开水送服。如遇感冒、食滞，需暂停数天。

按：此案为应用“素膏”之例。病员脾肺气阴两虚，但兼夹痰热，中焦气滞，故不宜用动物类胶以生滋腻而助痰热，呆气滞，改用桑枝膏以活血通络，枇杷叶膏以清肃肺气。方中除益气健脾、养阴调肺之品外，重用宣肺而清痰热的桑皮、款冬、百部、杏仁、川贝、黄芩、旋覆花、海浮石、半夏、陈皮、远志等药。综观全方，此补三攻七之剂，务在使邪去而正安。服膏方后，来年咳痰明显减少，食纳增进，形体稍丰，此辨证施补之功也。

中药耳压综合治疗泌尿系结石20例

上海梅山工程指挥部职工医院 曾金华 胡军林

我们在耳压治疗胆石症的启发下，运用中药、耳压等综合疗法治疗20例泌尿系结石，取得一定临床效果，兹报告如下。

一、临床资料：本组20例，男14例，女6例；年龄20~57岁，其中20~40岁者15人；病程最长者20年，最短者1个月。根据X线尿路平片或静脉肾盂造影证实，20例患者中共有结石24块(4例有结石2块)，其中肾结石3块，输尿管结石18块(输尿管上段结石7块，输尿管中段结石3块，输尿管下段结石8块)，膀胱结石3块。多数患者有腰部绞痛或腹部胀痛、血尿、肾区叩击痛等症状，部分病人有尿急、尿频、排尿困难、恶心呕吐等。

二、治疗方法：1. 中药：金钱草60克，车前子

草各30克。煎成2大热水瓶汤液，以此代茶饮，每日1剂。2. 耳压法：取耳穴神门、交感、皮质下、肾、输尿管、膀胱、松肌点。用橡皮膏粘1粒王不留行贴在耳穴上，每周2次，左右耳轮流换贴，每日用手按压耳穴8次以上。3. 跳跃运动：每日患者自行跳跃3次以上，每次不少于200跳。肾、输尿管结石用中药耳压及跳跃综合治疗；膀胱结石用中药、耳压治疗。

三、治疗结果：20例患者中，经治疗结石全部排出、X线复查原结石阴影消失者评为痊愈，共11例；经治疗排出部分结石或X线复查结石下移1厘米以上，或临床症状消失者(尿检正常)评为好转，共7例；经治疗X线复查结石数量、位置无变化、临床症状未减轻者评为无效，共2例；总有效率为90%。