

讨 论

一、出血热发热期的传变特点

本病为温疫热毒伤人,故传变迅速。发热期卫分阶段甚为短暂,旋即传至气分及营分。在传变过程中可以表现为卫气同病,气营或气血两燔等兼夹证候。热毒入里,热结胃肠而导致的阳明腑实证,在本病的发热期很多见,本文统计约占66.2%,且多见于重症。一般而言,对温热病气分证的治疗,必须遵循“到气才可清气”的原则,更不应妄投清营之品,以免凉遏太早,导致邪热内陷入里。但就出血热而言,由于卫气营血传变过程极为迅速,在气分阶段,邪热多已波及营分。部分重症病例,入院时虽以气分热盛为主,但邪热亦很快入营,多具有气营两燔之候。为此,必须早期应用清瘟合剂气营两清,防止病邪进一步内陷营血,中止病情传变,可以使本病不经过五期过程,明显地缩短病程,从而提高疗效。

二、清气凉营具有明显退热和解毒作用

出血热发热期证见气营两燔者,固当清气与凉营并施,即使邪热内传入营,亦应在清营药中参以透泄,分消其邪,使营分之热转出气分而解,此即叶天士所谓“入营犹可透热转气”。清瘟合剂之用银花、石膏等,即取其辛寒清气,透邪外达之意。故应用本药有明显退热作用,其降温特点为体温逐渐下降,有少量出汗,自觉症状减轻,无反跳现象。我们认为清瘟合剂的降温效果可能是由于能抑制病毒,减轻病毒对机体的损害,具有解毒作用,但必须早期应用,才能迅速控制疾病演变。

三、通利腑气可以改善或防止肾功能衰竭

据临床观察,治疗过程中发生少尿、尿闭者,中药组明显少于对照组,尿蛋白转阴及尿素氮恢复正常时间,中药组均明显短于对照组,实验表明本药可以降低毛细血管通透性。由于清瘟合剂在清气凉营的同时用大黄直下里热,釜底抽薪,可以疏通瘀热壅结的病理状态,使邪毒从下而泄,故药后一般每天大便2~3次,得利后自觉腹中舒适,身热随之递

降,且无导致或加重低血压的情况。根据临床疗效分析,本药能使绝大多数病例越过少尿期或缩短少尿病程,这与温病下不嫌早的论点是一致的。

四、凉营与化瘀合伍具有活血止血的效果

在本病的病理演变过程中,大多数病例存在不同程度微循环障碍,部分病例有出血倾向。提示本病疫毒深重,容易内陷营血,热迫血行,引起出血;而邪热入营,火热煎熬,又可导致血瘀。由于热郁血瘀与出血同时存在,故治疗宜凉血、行血。在发热期应用清瘟合剂后血细胞的聚集性、粘滞性及甲皱微循环均明显改善。

五、清气泄热、凉营化瘀可以祛邪扶正

观察治疗前后的免疫功能动态变化,提示清瘟合剂能提高细胞免疫功能,降低体液免疫功能,对机体免疫有双向调节作用。因此,清瘟合剂作用是多方面的。它可能具有直接、间接抑制病毒作用和直接杀菌作用,并增强和调节机体的免疫功能,增强抗病能力,有助于机体抵抗力的恢复。

东海县人民医院徐德先、高淳县人民医院柏瑾、无锡市传染病院汪瑶君、无锡县人民医院徐大立、新沂县人民医院孙景顺、周义等同志参加临床部分验证工作,在此致谢。

中药治疗蚕豆病介绍

四川省荣县乐德区医院 吴 国 权

因进食蚕豆或接触蚕豆花粉而引起溶血性贫血,在我国并不少见,一般以输血与激素配合应用。1981年我院治疗本病轻、中型患者8例,采用中药治疗取得良好效果,现将治疗方法介绍于下。

药物组成:梔子、当归、川芎、丹参、党参各10克,柴胡9克,丹皮、木通、大黄各6克。每日一剂,煎服。待黄疸减退,发热降低后改用以下药物:黄芪20克,党参、丹参各15克,当归、白术各10克。对中度溶血患者,配合输液及纠酸治疗。