

小 结

综上所述,近三十年中医药辨治糖尿病有了可喜的进展,病因学说不断丰富,辨证分型和治疗手段不断充实,疗效已经肯定,尤其对改善临床症状及防治并发症方面更为突出。但由于各地疗效标准不统一,有的报道例数较少,目前大多停留在临床观察,而对中草药及其复方的作用机理的实验研究、并发症的研究开展的不够。这些都是今后研究的重要课题。

参 考 文 献

- (1) 吕仁和:糖尿病。第一版:第7页,人民卫生出版社,1983。
- (2) 蒋瑞峰:新中医(2):46,1981。
- (3) 赵尚久:湖南中医学院学报(3):22,1980。
- (4) 周安方:湖北中医杂志(4):45,1980。
- (5) 俞维良:中医杂志(1):47,1982。
- (6) 陈泽霖等:上海中医药杂志(6):43,1983。
- (7) 祝湛予等:中西医结合杂志(3):143,1983。
- (8) 马秀华等:中西医结合杂志(10):633,1985。
- (9) 邵启忠等:上海中医药杂志(5):15,1983。
- (10) 程宜福:江苏中医杂志(2):5,1981。
- (11) 李皓平:新中医(11):37,1982。
- (12) 李 良:浙江中医杂志(4):180,1982。
- (13) 李志铭:新中医(4):7,1979。
- (14) 邢树霖:黑龙江医药(1):11,1979。

- (15) 刘植源:中医杂志(10):529,1957。
- (16) 翁建良:广西中医药(1):1,1982。
- (17) 张云如等:辽宁中医杂志(5):40,1982。
- (18) 张树恩等:中医杂志(4):37,1986。
- (19) 祝湛予等:上海中医药杂志(6):5,1982。
- (20) 蒋天佑:黑龙江中医药(2):26,1982。
- (21) 李 良:新中医(12):1,1983。
- (22) 田永淑:吉林中医药(5):22,1983。
- (23) 滕岳明等:中西医结合杂志(2):91,1983。
- (24) 韩蔚玲等:天津医药杂志(2):7,1980。
- (25) 杨扶国等:辽宁中医杂志(10):31,1980。
- (26) 安邦崇等:中医杂志(6):31,1983。
- (27) 李敏林:中医杂志(10):30,1983。
- (28) 郭玉英:中医杂志(7):39,1982。
- (29) 王宗根:中西医结合杂志(10):593,1986。
- (30) 屠伯言:中医杂志(4):39,1984。
- (31) 姚芳蔚:上海中医药杂志(9):5,1983。
- (32) 屠伯言:山东中医杂志(2):11,1983。
- (33) 陈铨:浙江中医杂志(9):401,1983。
- (34) 祝湛予:新医药学杂志(5):200,1978。
- (35) 北京医学院附属人民医院:中华内科杂志(3):138,1977。
- (36) 胡世林:山东中医学院学报(2):56,1982。
- (37) 施赛珠:中西医结合杂志(9):573,1986。
- (38) 陈全新:新中医(4):20,1975。
- (39) 湛剑飞:中国针灸(1):1,1983。
- (40) 湛剑飞:江西中医药(3):45,1983。
- (41) 刘士豪:中华内科杂志(1):1,1982。
- (42) 胡励军:福建中医药(1):51,1982。
- (43) 蒋国彦:《新体育》2:43,1979。

经 来 癲 哭 案

广西天等县人民医院 龙 锦 焯

患者赵×,女,17岁,未婚,1984年8月12日就诊。月经来潮则癲哭两年余。14岁时,持续头晕且伴阵发性剧烈头痛近两个多月,1981年6月经××医院诊断:左额叶颅内肿瘤(良性)。同月行肿瘤摘除术,术后加钴⁶⁰放射治疗。出院后恢复良好。头晕头痛诸症消失,且能正常上学。月经初潮是手术前6天,经量少,色淡红,行经两天干净,行经前后病孩无不良感觉。术后半年来第二次月经,经量、经色及行经天数正常,但行经前后烦躁,有低声乱言乱语及哭泣症状。日轻夜重,经净后3~4天症状消失。月月如此,发病已有两年多,多次治疗未见好转。1984年6月因见病太甚而在区医院就诊,经脑电图、脑超声波、头颅正侧位片检查,未见异常。以后四处求医不效,遂来我处就诊。

发病两天主症如前述。刻诊时见面赤唇红,神可,纳佳,口不渴,尿清长,舌淡红,苔薄白,脉大无

力。

本次发病,有一医处以六味地黄汤,未效。诊见手术口位于前额正中,此适督脉循行之位。术后督脉大伤,阳气大损。加之经水初潮,适遇手术,使初盛之肾气受挫。证属元阳大损,心神失养之癲哭症。故治宜大补元阳,镇心安神,方选桂附八味丸加味:附子6克,肉桂6克,熟地10克,怀山药12克,泽泻12克,茯苓30克,丹皮10克,山茱萸10克,龙骨粉60克,牡蛎粉60克,六剂。

药后夜能安睡,仍以上方,随症加减,前后共服21剂,神佳、纳好而复学。随访至1985年2月,未见复发。

按:此证脉大而无,面虽红赤但尿清,口不渴,舌质淡白,且病情多在夜间阳衰阴盛时加重,均为阳虚之征,故予桂附八味丸加龙骨、牡蛎温补元阳,镇心安神而获效。