

白术 12g, 生黄芪 30g, 乌梅 6g, 服 5 剂以巩固。

按: 本例卫外不固, 肺郁失宣。初诊用麻黄连翘赤小豆汤加味, “金郁泄之”, 以宣畅通调为先务; 继以玉屏风散安内攘外, 贼风不复再犯, 10 载顽疹顿除。

5 “水郁折之”治膝部积液

王某, 男, 60 岁。右膝关节肿胀已 3 月余。右膝部肤色不变, 屈伸不利, 指诊有波动征。面色苍白, 形寒肢冷, 腰腿酸软, 便溏尿少。舌淡苔白, 脉沉细。辨为水湿停聚, 脾肾阳微, 化气不利, 水郁为病, 治宜折之。药用: 桂枝、附片、苍术、白术、茯苓、猪苓各 10g, 熟地、山药各 30g,

山萸肉、杜仲、炒白芍各 15g, 干姜 5g。10 剂后, 便成形, 尿通畅。又进 10 剂, 膝肿大减。守方续进 10 剂而愈。嘱服金匱肾气丸, 以巩固之。

按: 本例乃三阴之羸, 即少阴肾阳衰微, 不足以制水; 太阴脾阳虚弱, 不能运湿(水); 厥阴肝血虚, 不能胜风。阳虚不能化气以行水, 导致膝关节腔积液。方选真武汤加味通阳化气以利水, 原方去生姜, 易干姜合附子以温阳化气; 用二术配茯苓健脾以运湿(水); 用当归、芍药配杜仲和阴舒筋以缓急; 用桂枝合地、萸等温肾化气以复肾气, 使水邪有出路, “水郁折之”, 膝部积液潜消。

象皮生肌散纱条外敷治疗皮肤溃疡 102 例

刘 丽 芳*

皮肤溃疡是外科、皮肤科常见病症, 我科多年来应用谭新华教授的经验方象皮生肌散纱条外敷治疗本病取得了显著疗效, 现报道如下。

1 临床资料

全部病例均为本院外科住院患者。男 73 例, 女 29 例; 年龄 18 岁~74 岁, 平均 45.8 岁。患病部位: 足部、小腿 65 例, 大腿 3 例, 前臂 4 例, 背部 13 例, 后项 8 例, 颈部 1 例, 胸壁 2 例, 尾骶部 6 例。

急性化脓性感染所致溃疡 33 例; 下肢慢性溃疡 31 例, 褥疮 6 例, 糖尿病坏疽 26 例, 注射抗癌药物渗漏所致溃疡 1 例, 多次植皮术后残留慢性溃疡 2 例, 恶性肿瘤放疗所致溃疡 3 例。病程 7 天~8 月, 平均 3 月, 面积最大者 20cm×15cm, 最小者 2cm×1.5cm, 平均 4cm×5cm。

2 治疗方法

象皮生肌散纱条制备: 先将无菌纱条剪成小片状, 放在容积约 500ml 消毒过的器皿内, 倒入象皮生肌散(药物组成及制法: 象皮粉 15g, 儿茶 10g, 炉甘石 30g, 血竭 10g, 轻粉 5g, 煅龙骨 15g, 乳香 15g, 没药 10g, 冰片 5g, 麝香 0.25g, 各研极细末, 混匀分装备用, 每包 30g)1 包, 再加适量麻油, 不断搅拌至药粉与麻油均匀沾在纱条上为度。

使用方法: 换药时用双氧水、生理盐水清洗创面

后, 将象皮生肌散纱条敷在创面, 并延至创缘外 0.5~1cm 正常皮肤上, 外盖无菌纱条, 每天或隔天换药 1 次。创面外敷象皮生肌散后将出现一定量的液化物, 若溃疡面坏死组织已完全消除时, 可只用生理盐水外洗, 动作轻柔, 尽量不破坏溃疡基底部形成的保护膜。不管溃疡面积大小, 均不采用植皮术。治疗过程中根据辨证服用中药, 糖尿病患者配合降糖治疗。

3 疗效观察

本组 102 例患者全部治愈, 治愈率 100%。33 例急性溃疡, 采用象皮生肌散纱条外敷后, 逐渐从周围上皮修复愈合, 平均愈合时间 15 天。69 例多种原因所致慢性溃疡, 应用本法治疗后, 创面肉芽组织逐渐转变为鲜红色, 溃疡面缩小, 上皮从创周向中央慢慢生长覆盖, 最后闭合, 平均愈合时间 34 天。

所有患者用药期间未出现过过敏反应, 创面分泌物细菌培养均为阴性。

4 体会

象皮生肌散中象皮、儿茶、煅龙骨、血竭均有较强的敛疮生肌作用, 为溃疡不敛, 疮口久不愈合的常用药; 炉甘石、冰片、儿茶有清热之功; 麝香、血竭、乳香、没药又有活血散瘀、消肿止痛之效; 轻粉、麝香有祛腐作用, 诸药合用, 共奏清热祛腐、活血散瘀、消肿止痛、收敛生肌之功。故能有效改善疮面及周围组织的微循环, 增强局部组织的新陈代谢, 抑制细菌繁殖, 使其肉芽组织顺利生长收敛愈合, 因而对急、慢性溃疡有良好的治疗作用。

* 湖南中医学院附属第一医院, 长沙市韶山路 105 号(410007)

收稿日期: 1997-11-24