

专

题

笔

谈

漫谈白芥子

中国中医研究院广安门医院(北京 100053)

谢海洲

白芥子性温,气锐,性善走散,豁痰利气,兼有消肿散结之功。元·朱丹溪曰:“痰在肋下及皮里膜外,非白芥子不能达。”《韩氏医通》云:“凡老人苦于痰气喘嗽,胸满懒气,不可妄投燥利之药,反耗真气,悉因人求治其亲,静中处三子养亲汤:紫苏子、白芥子、莱菔子。盖白芥子主痰,下气宽中;紫苏子主气,定喘止嗽;莱菔子主食,开痞降气。”近年用三子养亲汤合葶苈子、车前子,降气泻肺利水,减轻心脏症状,有助于控制心衰,可用治心内膜弹力纤维增生症。

白芥子与麻黄同用,为阳和汤之要药,辛能入肺,温能散表,痰在肋下及皮里膜外得此辛温以为搜剔,则内外宣通。故可治阴疽、乳癖。

对阴疽漫肿,用白芥子不论内服外用均有良效。曾遇一中年妇女,因外伤后静脉回流受阻,左臂漫肿不消,经用白芥子泥罨法,即取白芥子捣碎,摊在纱布上,敷于患处。内服益气化痰消痰之品,不二月而全消。

白芥子治疗美尼尔氏综合征

河南省新乡医学院第一附属医院(河南 453100)

刘清珍

笔者在临床实践中,以大量白芥子配方治疗美尼尔氏综合征,取得了满意的效果,现介绍如下。

方药:白芥子 15g,川芎 12g,半夏 12g,代赭石 12g,天麻 12g,茯苓 12g,党参 12g,熟地 12g。水煎早晚空腹服,每日 1 剂。呕吐加灶心土 30g。上方连用 5 天为一疗程。一般 1 个疗程症状减轻,2 个疗程痊愈。疗效标准:眩晕、恶心呕吐、耳鸣耳聋消失为痊愈;以上症状减轻为好

转;以上症状未减轻为无效。笔者自 1990 年以来,对 52 例经西医确诊,西药治疗无效的病例进行观察治疗,病程最短 1 年,最长 10 年。年龄最小 25 岁,最大 44 岁。结果治愈 40 例,有效 10 例,无效 2 例。总有效率 96%。

例 1:患者吴某某,女,40 岁,工人,1995 年 10 月 8 日就诊。患者患美尼尔氏综合征 5 年,每因劳累、生气、感冒后发病,每年发病 3~8 次不等,病后即感头晕如坐舟车,天旋地转,卧床不起,不能翻身及睁眼,动则恶心呕吐,不能进食。曾因此病多次住院治疗,用眩晕停、地巴唑口服,碳酸氢钠、甘露醇静注,低分子右旋糖酐静滴,症状好转后出院。此次发病后用上方去熟地,加白术 12g、陈皮 12g。服药 5 剂症状减轻,10 剂愈。随访 1 年未复发。

例 2:霍某某,女,29 岁,农民,1996 年 3 月 17 日就诊。患者患美尼尔氏综合征 6 年,每因劳累或生气而发病。1996 年 1 月发病后经用眩晕停、碳酸氢钠等药物治疗后,症状时轻时重,重时自感房屋倾倒旋转,恶心呕吐,头晕,耳胀,耳鸣。诊其脉细,舌苔薄白、舌尖红。属气阴不足,肝阳上扰,用上方去茯苓,加麦冬 12g、枸杞子 12g。服药 5 剂减轻,10 剂愈。继用上方加减巩固治疗 1 个月,随访 1 年未复发。

《本草求真》谓白芥子“书载能治肋下及皮里膜外之痰非此不达……,盖辛能入肺,温能散表,痰在肋下及皮里膜外,得此辛温以为搜剔,则内外宣通,而无阻隔窠囊留滞之患矣。”美尼尔氏综合征虽为内耳迷路水肿,亦属皮里膜外,故用白芥子为主遣方治疗,效果满意。笔者认为,白芥子辛散温通,能直达病源,化湿行水,故而效果良好,不易复发。