DOI:10.13288/j.11-2166/r.1998.05.002

专 题 笔 谈

白芥子治疗乳腺纤维囊性病

济南军区总医院(山东 250031)
杨 丁 友

白芥子治乳癖,《本草权度》有"研末水调,摊膏贴之,以平为期"的记载。朱震亨云:"痰在胁下及皮里膜外,非白芥子莫能达……"。笔者受其启迪,用白芥子治疗乳腺纤维囊性病疗效甚佳,介绍如下。

用白芥子 60～120g 研细末(一次量)装入消毒纱布袋内,先用温水外洗乳房患处,再用生姜汁涂患处皮肤,然后将纱布袋敷盖患处,绷带固定,3 天换药一次;内服中药煎剂在辨证的基础上加用白芥子 15g(后下)。上述方法均在月经来潮前 3～5 天开始用药,待经止后停药,作为一疗程,一般 3～4 疗程即可痊愈。

验案举例:周某,女,36 岁。2 年前因情志抑郁,致经前乳房肿痛。自触及乳房内黄豆粒大小块状物数枚,经后痛减,肿物变小。近半年来,症状加重,肿块呈增大趋势且不规则。行乳房钼靶摄片及穿刺细胞学检查后,确诊为乳腺纤维囊性病,因患者拒绝手术而求治于中医,辨证为肝郁痰凝,治以舒肝解郁,化痰散结。取其原服之方药:醋柴胡 12g,白芍 12g,郁金 12g,橘核 15g,路路通 12g,炮山甲 6g,清半夏 12g,全蝎 6g。另加白芥子 15g(后下),水煎,于月经来潮前 3～5 天始,早晚分服。同时患处照上法外敷白芥子粉,1 疗程肿痛明显减轻,肿块变小,数量减少,3 疗程痊愈,追踪半年未复发。

白芥子外用治癣疗疥疮

河北省康保县卫生学校(河北 076650)
宋 宪 源

笔者当地种植的白芥子,民间习用以治脚癣,余试之于疥疮,亦获良效,介绍如下。

药液配制:白芥子 300g 炒至深黄色,冰片 10g,共研细末。先用 70%酒精 500ml 浸泡 2 日,后加陈醋 500ml 浸泡 3 日,其间每日搅拌 3 次,再静置 2 日后倾出上清液,药渣用双层纱布包扎挤压余液,混合后用 1 号滤纸过滤两遍,得近 900ml 橙黄色药液,装灭菌容器。

癣病:手足癣糜烂型用 30%药液水;手足癣水疱型用 50%药液水;手足癣鳞屑角化型、体癣用 70%药液水。以上各型均浸泡或湿敷患部,每日 2 次,每次 30 分钟。头癣去掉患处毛发,用 90%药液水湿敷患处,每日 3 次,每次 20 分钟。1986～1996 年治疗 316 例,3 日内治愈 123 例(38.9%),4～7 日治愈 166 例(52.5%),无效 27 例(8.5%),总治愈率 91.5%。

疥疮:先用肥皂洗澡,拭干后,自头部以下,用 40%药液水遍搽全身 5 次;有丘疹水疱部位如手指间,用 70%药液水浸泡 20 分钟。每日 1 次,连续 2 日,隔 2 日再搽浸 1 次。1993～1996 年治疗 185 例,其中 6 例因皮肤过敏改用他法、9 例未坚持治疗,其余 170 例全部治愈。

注意事项:患者每天必须更换清洁衣袜或被罩床单,所换衣物须煮沸消毒。治愈后 2 月内衣被、鞋袜保持清洁,患癣者隔 5 日用 70%药液水搽原患处 1 遍。药液对皮肤有轻度刺激性,婴幼儿皮肤柔嫩使用时按上述类型浓度减半;依皮肤耐受性可增减浓度 10%左右;少数皮肤过敏者,若出现红色丘疹或小水泡应停用,随后自行消退。

白芥子外敷治疗体表纤维软瘤

江西省都昌县妇幼保健院(江西 332600)
王 丽 初

笔者以白芥子、蓖麻仁等分捣为细末,樟脑末少许同研,醋调外敷,治体表纤维软瘤,效果明显,举例如下。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net