

引起不育的基本机理是血瘀和肾虚。由于先天禀赋不足,肾气亏虚,气血失和致血流不畅而瘀滞于阴部脉络,瘀血积滞。旧血不去,则新血不能输布,肾失濡养,日久使其生精功能受到损害,引起生精异常而不育。故治疗当以祛除瘀血为本,辅活血化瘀以助生新血,补肾益气以助肾之生精。本组方中枸杞子、菟丝子、熟地、黄芪、党参、覆盆子、五味子、桑椹子等,益气养血,补肾填精;丹参、当归、桃仁、红花等活血化瘀。全方具有补肾活血之功效。现代研究证实,很多补肾中药能够提高精子成活率、精子活动率和精子密度,活血化瘀中药具有改善血液循环作用,对组织缺血、缺氧有保护作用。该方剂由我们多年治疗原发性男性不育的有效方加活血化瘀药而成。经临床观察证实,对促进精索静脉曲张不

育症患者术后睾丸生精功能的恢复有较好作用,制成冲剂更便于长期服用,其作用机理还有待进一步深入研究。

6 参考文献

- 1 Dhabuwala CB, Ramid S, Moghissi KS. The influence of varicocele on parameters of fertility in a large group of men presenting to infertility clinics. *Fertil Steril*, 1992, 57(6): 1289.
- 2 Pryor JL, Howards SS. Varicocele. *Urol Clin North Am*, 1987, 14: 499.
- 3 安立文, 郝荫德, 刘胜利, 等. 手术配合中药治疗精索静脉曲张男性不育症. *中医药学报*, 1992, 1: 33.
- 4 WHO 编. 陈文, 张光华, 贾孟春等译. 人类精液及精子-宫颈粘液相互作用实验室检验手册. 第3版. 北京: 科学出版社, 1994.
- 5 蔡晓晴, 屠业骏. 五羟色胺对精索静脉曲张患者睾丸生精功能的影响. *中华泌尿外科杂志*, 1995, 16(1): 38.

逍遥散合六味地黄汤治验举隅

胡 秀 润*

逍遥散、六味地黄汤分别为调理肝脾和填补阴精之剂。二方合用即可疏肝健脾和胃,又能补肾滋阴养血,使后天得健,先天得养,精血充足,气血调和,则顽疾得除。笔者在临床上,对证属肝郁脾虚血虚、胃气不和者,以二方合用灵活加减,取得了较好的疗效,现择举数例,以供同道参考。

1 脓疱型痤疮

耿某某,女,26岁,1986年10月30日初诊。颜面肤色潮红,丘疹、结节和脓疱布满整个面部,且非常密集。西医诊为脓疱型痤疮。数年来内服外用,多方求治,不见好转。并诉月经自初潮至今,经期或前或后,或数月不行,经来量少不畅,胸胁满闷,面部痤疮加重。且每遇情绪紧张则诸症更甚。诊见患者性格内向,少言寡语,舌红苔少,脉弦细。证属肝郁肾虚,冲任不调,阴火气血搏结而致。治宜疏肝解郁,滋补肾精,调和冲任。药用逍遥散合六味地黄汤加减:柴胡 10g, 当归 10g, 白芍 10g, 生地 20g, 山药 12g, 枸杞子 12g, 白术 10g, 茯苓 10g, 泽泻 10g, 丹皮 10g, 川楝子 10g, 薄荷 3g(后入)。自月经干净 3 天后开始,每日 1 剂,水煎服。15 天后改用

下方:柴胡 10g, 赤芍 10g, 当归 10g, 白术 10g, 茯苓 10g, 泽泻 10g, 丹皮 10g, 生大黄 10g(后入), 川楝子 10g。每日 1 剂,服至下次月经来潮的第 2 天停止。

复诊:月经已过,面部脓疱结痂,丘疹颜色变浅,部分消失。因煎药不便,故改用成药逍遥丸合六味地黄丸,各服 8 粒,一日 3 次,月经来潮后停服六味地黄丸,至经行通畅再停服逍遥丸。

三诊:月经正常,颜面痤疮全部消失,为巩固疗效,续用逍遥丸合六味地黄丸 1 个月,后随访未见复发。

2 复发性口腔溃疡

李某某,女,56岁,1989年2月26日初诊。患者反复发作性口腔溃疡病数年,每服消炎、清热解毒、维生素之类而愈。1年前因丈夫病故,伤心过度而复发,用前方无效。就诊时唇颊上腭、舌面等处有散在的如黄豆或绿豆大小的溃烂面,其表面灰白,周围粘膜颜色淡红,吃饭、喝水甚感痛苦。伴头晕目眩,腰酸腿痛,心烦易怒,胃脘不舒,口干欲饮,大便不实,舌红少苔,脉弦细数。初诊予知柏地黄丸,但治疗效果不佳。辨证审因,患者除阴虚肾亏之外,尚有肝郁脾虚之证,故治应疏肝健脾、滋阴补肾。改用浓缩逍遥丸和六味地黄丸,一日 3 次,每次各服 8 粒。

复诊:溃烂面全部消失,余证大减,续用上药巩固调理月余,诸症皆愈,后访无复发。

* 河南财经学院医院,河南省郑州市文化路
(450000)

收稿日期:1998-01-20