

理论探讨

张锡纯应用虫类药经验探析

雍 履 平*

主题词 虫类药/治疗应用 名医经验 @ 张锡纯

张锡纯(1860~1933)为汇通派临床医家,著《医学衷中参西录》,立方用药颇具特色,对虫类药应用尤有独到之处,仅病案所载,就有15味之多,涉及内、外、妇、儿、皮肤及五官等各科疾病。现就其用药经验探析如下。

1 熟谙性能,放手应用

理宗经旨,用有发挥,是张锡纯临床用药的显著特点,对虫类药应用体现尤为明显,凡最放手应用的,亦即对其性能功用最为娴熟之品。如水蛭、虻虫之所以为他所喜用,一是因《神农本草经》谓“水蛭气味咸平无毒”,“仲景抵当汤、大黄虻虫丸、百劳丸皆用水蛭”,用有所本;二是临证注意观察,水蛭、虻虫二者“皆破瘀之品,尝单用实验,虻虫无效,而水蛭有效”,水蛭生用有效,炙用无效。并举以例证,曾单用水蛭治一妇人少腹症瘕不育,油炙水蛭30g,分次服完无功,改生用同量,未服完症瘕尽消,逾年生一男。治肢体痿废之补脑振痿汤“必辅以虻虫,方有此效”。认为水蛭善入血分因其味咸,善破血是其噬血之物,破瘀血不伤新血乃其气腐与瘀血相感召,消瘀而无开破乃见于服后无腹痛。可谓对水蛭推崇倍至。但从临证经验看,应用虻虫范围较水蛭为广,认为仲景之下瘀血汤、大黄虻虫丸、鳖甲煎丸皆用虻虫,虻虫不仅能通瘀,而且能接续脑血管及其神经,故用于既治贲门癌、食管癌、胃癌及肝病,又治中风后遗症、血管性头痛、瘀血腰痛及闭经。如治贲门肿胀窄小,配苏木入旋覆代赭汤;治肢体痿废偏枯,同黄芪、赭

石入起痿汤和补脑起痿汤;治肝郁证佐以疏达肝气之品;治脑中作疼及闭经配牛膝;治瘀血腰痛以其煎汤送服活络效灵丹,治干血劳伍以健补脾肾药,均取得良好效果。李某腰痛数年不愈,服补肾强筋壮骨药数百剂未效,易用虻虫并伍山药、枸杞、当归、丹参、没药、五灵脂、穿山甲、桃仁、红花、三七,3剂服后,腰痛乃瘥。而水蛭仅用其治癌和消症(脑血管病亦可用),如治胃癌、食管癌,当服变质化痰丸和参赭培气汤无效时,则加水蛭粉1.5g作丸散或加6~10g入煎剂,而疗效始显;治妇人子宫肌瘤、卵巢囊肿及内脏肿块,加水蛭于理冲汤、理冲丸中,功效大增。一妇人年30余,症瘕起于少腹7年,渐长而上硬如石,服理冲汤30余剂虽减,但仍如核桃大,乃加水蛭3g,数剂痊愈。尽管如此,水蛭治其病种,稍逊于虻虫。

2 通观功效,辨证常用

蜈蚣、全蝎和僵蚕同为平肝熄风药,张锡纯亦最为常用,但三者相同者均用以祛风和凉血解毒,不同者是因三者性能各异,各具专功,况前二者有毒,故多需辨证施用。在祛风方面,作为表散风热引药和祛风镇风以僵蚕为最,用其搜风逐风以蜈蚣、全蝎为先。认为僵蚕因风而僵,与风同类,既可入于表散风热药为其向导,使外感风热及痘疹表而出之,又用其善引祛风药至其病所治疗中风和小儿急惊风,前者如搜风汤用之,后者如镇风汤用之。推崇蜈蚣性甚和平,从未有服之觉犹瞑眩者,其功最善搜风,贯穿经络脏腑无所不至,逐风之力迥异于他药。其一,入于逐风汤治中风抽掣和破伤风抽掣,如一媪,其腿被狗咬破受风,周身抽掣,医以含有全蝎之祛风活血助气方,调治十余日未效,遂改含有蜈蚣的逐风汤,1剂服后抽掣即止;其二,以

* 安徽省天长市中医医院,天长市新河路35号
(239300)

收稿日期:1998-01-02

蜈蚣 2 条为末,用防风 16g 煎汤送服治疗口眼歪斜,3 次痊愈;其三,与钩藤、薄荷同入白虎汤煎服,治疗小儿高热抽搐旋平;其四,加入镇肝熄风汤治疗眩晕、痫风兼脑充血以及小儿脐风,疗效卓著。张锡纯认为全蝎为蜈蚣搜风逐风之伍药,二者可相得益彰。然亦认为全蝎单用也有搜风逐风之功,如入逐风通痹汤中治风痹之肢体麻木、关节不利;用以治疗痉痛抽搐、中风之口眼歪斜及周身麻痹,均收到明显效果。在凉血解毒方面,三者亦有同功,僵蚕入于青孟汤中治疗瘟疫、表里俱热及阳毒发斑,取其僵蚕僵而不腐,治肿毒可阻断腐脓;蜈蚣入于大黄扫毒汤中治疗痈及疔毒走黄;单味全蝎治颌下脓肿,俱获良功。此正是张锡纯谓其蜈蚣、全蝎性虽微毒而转善解毒之验证。三药功专不同,一是由于蜈蚣走窜之力最速,内而脏腑,外而经络,凡气血凝聚之处皆能开之,不仅善理脑髓神经而有牵正口眼之力及其调安神经之特长,入于逐风通痹汤中内治中风口眼歪斜,而且为血瘀上脱噎膈证的开瘀急需之品;二是因其全蝎善入肝经,具有搜风发汗之能,如一壮年,半身麻木,重用单味全蝎,盐炒轧细,调入红糖水中顿服,得半身汗出,麻木遂愈。此外,蜈蚣为蛇所畏,还可以其 3 条配雄黄 6g 为末,用甘草、蚤休各 6g 煎汤送服,治蛇咬伤旬日当愈。而僵蚕则无此功能。

3 确知所长,专科选用

张氏对蜂房、蛇蜕、蝉蜕、地龙、蛭蟥、蜈蚣等虽不甚常用,但能依据所知之长,合理选用。这类虫药,较为常用的首推蝉蜕。一是用于解热,二是用于退目翳消疮疡,三是用于止小儿夜啼和治音哑。止夜啼以其单味煎服;治音哑配滑石、麦冬、胖大海、桑叶、薄荷泡茶频饮;退目翳以其配炉甘石、硼砂、薄荷冰制成磨翳散或磨翳水外用;消疮疡以其带足入方内服,取其两足刚硬有开破之力。尤为擅用的依然是解热,凡风热、温热、温疹、湿温俱能用其所长。治风热,以其蝉蜕能发汗,善解外感风热,既取单味 10g 煎服得微汗使表热解,又取与连翘、薄荷性近加入葛根黄连黄芩汤中清肌热;认为蝉蜕发汗乃调剂阴阳,听其自汗,其功远胜于桑菊饮、银翘散,

故入寒解汤中引胃中化而欲散之热,仍还太阳作汗而解,是有以皮达皮之妙。治温热,以其加入白虎汤中治阳明热证病犹连表,可一汗而解。治温疹,取其性微凉味淡,非辛散而能有发汗之长,入清解汤中引热达表、托疹外出,治体弱疹出不透之温病兼瘾疹者。治湿病,取蝉性饮而不食,有大便无小便,伍入宣解汤、滋阴宣解汤中治湿温初得,憎寒壮热、大便滑小便不利,以得清热化湿渗湿之功。总之,对蝉蜕之用,已臻佳境。至若余下之味,则知其一则用其一。如蛇蜕,认为既善去风又善解毒,用以治疗状若顽癣之癩证,其功可见,并说方中蝉蜕、僵蚕、全蝎、甘草、黄连、防风、天花粉、大枫子、生石膏诸药,皆可因证加减,如畏大枫子有毒可减去,而蛇蜕则在所必需。认为地龙与廋虫同具接续脑血管神经之力,故以伍入补脑振痿汤治疗肢体偏枯痿废。蛭蟥炙饴或油炙内服以治目翳或内障。取蜈蚣一身多用,后半身功擅利水,焙研调服或加麝香纳脐以治小便不利;前半身功专开破,用治水肿、头面肿及泌尿系结石;若前后二便不通者,则取全身用之。唯蜂房用之不宽,仅洗髓丹中用之内服治疗杨梅疮毒。

4 扬长避短,佐药辅用

凡药皆有其长,亦皆有其短,虫类药尤为显著。张氏应用虫类药,不仅擅用其长,尤注意药物毒性、峻悍及患者的体质状况。一是毒性大的药物则多外用。如斑蝥、蟾酥毒性大而可解毒、通瘀、利小便,张氏则取斑蝥以糯米炒黄并去足翅,入于外治异功散中贴敷结喉两旁,治疗咽喉肿痛症;举其民俗方以蟾酥焙发并配雄黄、麝香为散,鼻闻之治小便不通。二是替代或用扶正药辅之。如用廋虫、水蛭治女子干血劳证,“如嫌诸药之强悍,若桃仁、红花亦可以替代。然又须多用补正之药品以驾驭之,始能有益而无害也。”三是服毒性药反应,以清热解毒药解之。如含有蜂房之洗髓丹治杨梅疮毒,“服药之后,其牙龈必肿,间有烂者”,“或用甘草、蓬(硼)砂、金银花熬水漱之”。四是非壮实体质,虫药不可过量。如盐炒轧细全蝎 60g,调糖水顿服治愈中风半身

(下转第 344 页)

4.4 循环免疫复合物变化:治疗半年后均值与治疗前相比有显著下降,治疗2年后基本恢复到正常水平,见附表。

4.5 腹部B超探查:48例患者中治疗前门脉增宽者21例(43.8%),服药2年后门脉宽度缩小12例,宽度不变5例,宽度增加4例;治疗前门脉正常,治疗后增宽1例,余26例2年内门脉保持正常。治疗前及治疗2年间脾脏在正常范围,变化不明显24例,治疗前脾脏增大者24例,治疗2年脾脏前后径有所减少9例(37.5%),变化不明显6例(25.0%),脾脏增大9例(37.5%)。

附表 治疗前后HA、PCⅢ、CIC变化情况($\bar{X} \pm S$)

时间	例数	HA(ng/ml)	PCⅢ(ng/ml)	CIC(mg/ml)
治疗前	48	647.3±135.4	153.8±21.2	311.2±132.8
治疗半年	48	251.7±104.8	114.3±33	150.3±84.9
治疗2年	48	52.19±41.4	72.8±12.4	107.6±62.6

5 讨论

本文总结了应用中医补肾益气、凉血活血、疏肝清热、利湿解毒法组方,对48例肝硬化患者连续治疗2年以上,可明显改善症状,对肝功能指标有改善作用,对肝硬化血清学指标及循环免疫复合物有明显作用。

慢性乙肝肝硬化患者临床表现为乏力、纳差、腹胀、黄疸、肝脾肿大、肝区疼痛、肝掌、舌紫暗,病因为湿、热、毒、瘀、郁、虚,湿热毒瘀互结入络,肝郁,脾气亏虚,肾精亏损,阴阳失调,虚实兼夹,互为因果,恶性循环,贯彻始终。早期邪毒较甚,肝木横克脾土,晚期久病及肾,肾阴

阳气血亏损,湿热血瘀入络。

在临床观察中我们发现,转氨酶持续不降与血瘀入络有关,通过补肾益气活血可以收到较好效果,但活血化瘀药可用但不可过用,过用可加重原已充血的肝细胞,使ALT更高。我们还发现,白蛋白降低与气虚有关,通过加用补气药如黄芪、仙茅等可使血清白蛋白升高。球蛋白升高与血虚、血瘀血热有关,加用补血清血活血药可使球蛋白下降,如当归、生地、赤芍、丹皮、茜草、水牛角、丹参等。胆红素升高与瘀热互结入络有关,加重凉血活血药,可提高退黄疗效。

凝血酶原时间延长与气血亏虚、血热血瘀有关,加用丹皮、党参、旱莲草、茜草有较好疗效。本文还显示肝硬化患者血清循环免疫复合物增高,用中医补肾健脾益气、凉血活血疏肝、清热利湿解毒法组方,可能通过改善严重受损的肝功能,增强网状内皮系统的清除功能,或通过消除病毒减少抗原抗体复合物数量,减少血清中的CIC,减轻免疫损伤,从而终止免疫因素诱发肝纤维化的启动环节。

HA是结缔组织基质的主要成分,是反映内皮细胞功能和肝硬化有实用价值的指标。在肝硬化时,HA、PCⅢ升高揭示纤维化过程处于活动阶段。治疗后持续下降和稳定,表明纤维化的活动过程已被抑制。这一作用可能与其具有免疫调控作用及直接影响肝内纤维结缔组织的代谢有关。

注:该课题为广东省1997年科研重点项目(编号:30)

(上接第329页)

麻木,“然未免药力太过,非壮实之人不可轻用”。此当注意,全蝎用量已超常量1g的60倍,临证不可造次。可见,张锡纯应用虫类药既能扬其药用之长,又能避其药用之短,实为虫类药之善用者。唯对蜈蚣欠慎用。蜈蚣又名红娘子,含斑蝥素,与斑蝥同,有剧毒,性味猛烈,为虫类之最酷者,内服宜慎,体弱、孕妇忌用,仅有治疯狗咬伤,以红娘子2枚配方作末,1~2次分服之报道,而张锡纯却常用6~15枚配方治疗胃痛、

妇人症瘕、闭经及产后四肢抽掣,值得商榷。尤其一宋氏女,19岁,胃有瘀滞作痛,当用药无效时,以蜈蚣15枚,配鸡内金30g,生酒曲、党参各15g,三棱、莪术、知母各10g,服至8剂,二便皆下血,胃中豁然,其痛痊愈。此虽系典型验案,余以为“二便皆下血”,乃蜈蚣毒性反应,胃粘膜及肾功能已受损害,从用药安全起见,剧毒虫类药应当掌握用量用法及其适应证和宜忌。虽然如此,张锡纯应用虫类药的独到经验,依然不失为有益的借鉴。